

키디

맛있게 따먹는 소년증탕 연조엑스

[원료약품 및 분량] 1포 중 · 유효성분:

게지(생규).....	330mg	작약(KP).....	500mg
대추(KP).....	330mg	건강(KP).....	110mg
감초(KP).....	250mg		
이상으로부터 추출한 수침 연조엑스.....			200mg
교이(생규).....			1,670mg
· 첨가제(보존제): 파라옥시벤조산메틸 0.42mg, 파라옥시벤조산프로필 0.18mg			
· 기타 첨가제: L-글루탐산나트륨수화물, 고과당55, 정제수, 포도향 SJ-G(3104144), 한천			

[성상] 알루미늄포에 든 감미를 가진 흑갈색의 연조엑스제

[효능·효과] 체질 허약으로 피로하기 쉽고 혈액이 좋지 않으며 복통, 두근거림, 손발이 화끈거려거나 냉하고 빈뇨 또는 다뇨 등을 수반하는 증상: 소아허약체질, 피로권태, 신경질, 만성위장염, 소아아뇨증, 아제증(어린이가 밤에 울고 보채는 증상)

[용법·용량]

보통 성인 1회 4포, 7~14세 2.6포(성인 용량의 2/3),
4~6세 2포(성인 용량의 1/2), 2~3세 1.3포(성인 용량의 1/3),
1세 이하 1포 이하(성인 용량의 1/4)를 1일 3회 식전 또는 식간에 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 3개월 미만의 영아
 - 2) 격렬한 구역, 구토의 증상이 있는 환자
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오.
 - 1) 고혈압 환자
 - 2) 심장에 또는 신장에 환자
 - 3) 부종 환자
 - 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
 - 5) 고령자(일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의하십시오.)
 - 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 7) 구역, 구토의 증상이 있는 환자
 - 8) 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
 - 9) 1세 이하의 영아(의사의 진료를 받는 것을 우선으로 하며, 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 마십시오.)
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - (1) 위알도스테론증: 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.)
 - (2) 근병증(근육병증): 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.
 - (3) 피부: 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움
 - (4) 소화기계: 구토, 설사
 - 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오.
 - 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용시키십시오.
 - 4) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이디드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로 신중히 복용하십시오.
 - 5) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의하십시오.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오(사용 후 반드시 밀폐 보관하십시오.)
 - 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

[저장 방법] 밀폐용기

[포장 단위] 1포(7.5g)X30, 1포(7.5g)X60

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.
본 제품은 공정거래위원회 고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
기타 자세한 사항은 삼익제약 홈페이지(<http://www.samik.co.kr>) 또는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 의약품 정보를 참조하세요. 200420, 작성일자: 2019. 12. 26

- 본 제품의 적절한 사용에도 불구하고 부작용 발생 시, 한국 의약품안전관리원(1644-6223)으로 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

- 삼익제약주식회사: 인천광역시 부평구 청안로 13 / 학술개발부 (02)928-0661