


상처, 화농성 피부질환에...

분류번호 : 611



푸시드산나트륨은 살균력이 강하고 표피침투력이 우수한 항생제입니다. 다른 항생제와는 달리 Steroid 유사구조를 지니고 있어 저농도로서 치료효과가 우수하고 신속하며 파괴된 피부조직을 재생, 촉진합니다. 교차내성이 없기 때문에 다른 항생제가 유효하지 않는 경우에도 효과가 좋은 항생제 연고입니다.

[성분 · 함량] 1그램중

푸시드산나트륨(KP) 20.0mg(약가)

[성상] 무색의 반투명한 연고제

[효능 · 효과]

• 유효균종

도도구균, 연쇄구균, 코리네박테리움, 클로스트리듐속

• 적응증

1. 주효능 · 효과 : 농피증(고름피부증)(농가진(고름딱지증), 감염성 습진양 피부염, 모낭염, 부스럼 및 부스럼증, 화농성 한선염, 농가진성 습진), 화상, 외상(상처)

2. 다음 질환에도 사용할 수 있습니다.

여드름(심상성 좌창), 봉합창, 식피창(피부이식 후 생긴 상처)에 의한 2차 감염

[용법 · 용량] 환부(질환부위)를 깨끗이 하고 1일 수회(여러차례) 적당량을 환부(질환부위)에 직접 바르거나 무균거즈에 넓게 펴 발라 붙이십시오. 두꺼운 층에는 적용을 피하며 보통 1주 정도로 투여기간을 제한하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오. 1) 푸시드산 및 그의 염에 과민증의 병력이 있는 환자

2) 비감수성균(특히 녹농균(푸른고름균))에 의한 감염 환자 2. 부작용 때때로 발진, 약한 동통(통증) 및 자극 등에 과민증이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하십시오. 3. 일반적 주의 1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현등을 방지하기 위하여 원칙적으로 감수성을 확인하고 치료상 필요기간만 투여하십시오. 2) 감작(과민한 상태로 만듦)될 우려가 있으므로 충분히 관찰하고 감작된 증후(가려움, 발적(충혈되어 붉어짐), 종창(부기), 구진, 소수포(물집)등)가 나타날 경우에는 투여를 중지하십시오. 3) 이 약은 높은 투과흡수성을 가지므로 장기간 또는 광범위한 표면에 투여하지 않도록 주의하십시오. 4) 국소사용시 내성균이 발현되면 추후 동일한 항생물질을 경구투여(복용)시 해로울 수 있습니다. 그러나 대체로 내성균은 단시간내 다시 이 약에 대해 감수성을 갖게 됩니다. 4. 임부에 대한 투여 이 약은 전신투여시 태반관통을 통과한다는 보고가 있으므로 국소사용시 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.

5. 수유부에 대한 투여 1) 수유부가 유방감염에 이 약을 사용할 경우 신생아에게 흡수될 수 있습니다. 2) 수유부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않고 전신투여시 유즙으로의 이행이 보고되었으나 국소사용시 상용량에서는 유아에 영향을 미치지 않습니다. 6. 미숙아 및 신생아에 대한 투여 미숙아 및 신생아는 간기능이 미숙하므로 장기간 또는 광범위한 표면에 투여할 경우에는 간기능 장애를 일으킬 수 있으므로 주의하십시오. 7. 적용상의 주의 1) 안과용으로 사용하지 마십시오. 2) 눈 또는 눈꺼풀과 같은 얼굴 안쪽에 사용하는 것은 적합하지 않습니다.

[저장 방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 **[포장 단위]** 15g

• 제조자 : 태극제약(주) 경기도 화성시 향남읍 상산리 907-4

• 제조의뢰자 : 삼익제약주식회사

※ 구입시 유효기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다. 본 제품은 공정거래위원회 고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 삼익제약 홈페이지(www.samik.co.kr) 또는 이디드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보를 참조하세요. 110708



삼익제약주식회사

인천광역시 부평구 청천1동 374-1
학술/개발부 : (02)928-0661