

조-옥 따먹는 **효과빠른 멀미약**

노보민 시럽

성인용

분류번호 : 235

일반의약품

【성분 · 함량】 100mL 중

메클리진염산염수화물 (KP)	416.7mg
카페인무수물 (KP)	333.3mg
피리독신염산염 (KP)	83.3mg
첨가제 (보존제) : 파라옥시벤조산메틸	7.0mg
파라옥시벤조산프로필	3.0mg

【성 상】 알루미늄포에 충전된 오렌지향과 감미를 가진 옅은 황색의 시럽제

【효능 · 효과】 멀미에 의한 어지러움, 구토, 두통의 예방 및 완화

【용법 · 용량】

만 15세 이상 : 1회 1포 (6mL)

만 13세 이상 ~ 만 15세 미만 : 1회 $\frac{2}{3}$ 포 (4mL)

멀미의 예방에는 승차 30분 전에 1회 복용량을 복용하십시오.

또 필요시 추가복용할 경우에는 1회 복용량을 4시간 이상의 간격을 두고 복용하십시오.

1일 복용횟수는 3회를 한도로 하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 만 3세 미만의 영 · 유아
- 2) 만 12세 이하의 어린이

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오.

- 1) 다른 진통제, 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제, 진해거담제(기침 · 가래약) 등

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 약으로 일레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 3) 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 환자, 배뇨(소변을 뎀)장애 환자
- 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 5) 폐기종 혹은 만성 기관지염과 같은 호흡기 질환을 앓고 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약을 복용함으로써 발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등이 나타날 경우
- 2) 이 약을 복용함으로써 구갈(목마름)이 나타나는 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여하지 마십시오.
- 3) 이 약을 복용함으로써 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의하십시오.
- 4) 1포를 분할한 후 잔량을 사용할 경우에는 입구를 잘 봉하여 보관하고 2일 이내 사용하십시오.
- 5) 이 약을 복용하는 동안 알코올 음료를 마시지 마십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장 방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 【포장 단위】 1포 (6mL) X 자사포장단위

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다. 본 제품은 공 정거래위원회 고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 삼 익제약 홈페이지(www.samik.co.kr) 또는 온라인의약품서관(drug.mfds.go.kr) 의약품 정보를 참조하세요. 150330


삼익제약주식회사

인천광역시 부평구 청안로 13
학술/개발부 : (02)928-0661