

천연 골다공증 치료제

오소본정

(오소판 물질)

골밀도가 점차적으로 감소하여 경미한 충격에도 쉽게 골절을 일으킬 수 있는 골다공증은 다른 질환과 달리 치료에 대한 반응이 느리고 잘 낫지 않습니다. 따라서 사전에 예방하는 것이 매우 중요한데 소아 및 청소년기에는 골량(骨量)이 최고로 형성될 수 있도록 하며, 성인기에는 형성된 골량을 유지토록 하고, 노년기에는 골량이 감소하는 것을 막는 것이 필요합니다.

서울제약 오소본정은 뼈의 기초 구조물질과 매우 유사한 오소판물질을 주원료로 하고 있습니다. 오소판물질은 칼슘과 인을 공급하는데 있어서 천연 골격 단백질인 콜라겐과 글루코사민 등이 필수 미량원소들과 함께 함유되어 있어 합성 칼슘제제보다 골다공증의 예방과 치료에 효과적입니다.

■ 성분·함량 : 1정 중
오소판 물질(KPC) 830mg
(동물유래 : 송아지 장골)
첨가제(타르색소) : 황색4호(타르타르진)

■ 성 상 : 장방형의 황색 필름코팅정

■ 효능·효과 : 다음 경우의 칼슘과 인의 보급

1. 골다공증, 골절치유 촉진 2. 임신·수유부

■ 용법·용량

골다공증 : 오소판물질로서 성인 1회 1660~3320mg 1일 2회 복용하십시오.

기타적응증 : 이 약으로서 성인 1회 830~1660mg 1일 1회 복용하십시오.

음료와 같이 식전 복용하십시오.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis) 환자, 신질환 환자
- 2) 신결석증의 병력이 있는 고칼슘노증 환자
- 3) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자
- 4) 12개월 미만의 영아
- 5) 신결석 환자
- 6) 중증의 신부전 환자

2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오.

- 1) 테트라사이클린 : 이 약의 흡수를 저하, 최소 4시간의 간격을 두고 복용하십시오.
- 2) 인산염, 칼슘염, 제산제

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 거동이 불편한 반신불수 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민 D 또는 칼슘의 투여를 피하십시오.
- 4) 심장, 순환기계기능 장애 환자
- 5) 요결석 형성의 경향을 보이는 환자, 신장에 환자
- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 강심배당체를 투여 중인 환자
- 8) 이 약의 투여중에는 고용량의 비타민 D를 섭취하지 마십시오.
- 9) 불화나트륨을 복용하는 사람(최소 3시간의 간격을 두고 복용)
- 10) 알칼도스테론제, 트리암테렌을 복용하는 사람(고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.)
- 11) 치아자이드 이노제를 복용하는 사람(이 약의 배설을 저하)

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 구역질, 구토, 피부발진
- 2) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석
- 3) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 초기에 칼슘이 요를 통해 배설될 수 있으므로 주의하십시오.(경우에 따라 결석이 형성되기 쉽습니다.).
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용하십시오.
- 4) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하여 건냉한 곳에 실온 보관하십시오.
- 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

8. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

이 약은 황색4호(타르타르진)를 함유하고 있으므로 약물에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 100정, 300정

* 본품을 구입할 때 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 본제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

* 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품 정보」를 참조하십시오.

<이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.seoulpharma.com이나(080)780-1931에서 확인할 수 있습니다.>

최종작성일자 : 2012. 03. 21



마음까지 건강하게
(주)서울제약
경기도 시흥시 경제로 59
문의전화: (080)780-1931