

[이 약을 사용하기 전에 첨부된 문서를 주의깊게 읽으시기 바랍니다.
읽으신 후 버리지 마시고, 이 약과 함께 보관하시기 바랍니다.]

메섹신®정/캡슐 500mg

MESEXIN® Tab./Cap.
메틸올세팔렉신리시네이트 (Methylol cephallexin lysinate)

메섹신의 주성분인 methylol cephallexin lysinate는 새로운 분자구조의 물질로서 다 세팔렉신 제제보다 높은 혈장농도 및 조직농도를 지속적으로 유지하는 등의 약동력학적인 장점이 있습니다.

【원료약품 및 그 분량】

1 정 중	
메틸올세팔렉신리시네이트(Methylol cephallexin lysinate)(KPC)	500mg
(세팔렉신으로서 329mg (약가))	
첨가제(식약청인정타르색소) : 황색 5호(Sunset yellow FCF), 적색 3호(Erythrosine)	
1 캡슐 중	
메틸올세팔렉신리시네이트(Methylol cephallexin lysinate)(KPC)	500mg
(세팔렉신으로서 329mg (약가))	

【성 상】

정 : 주황색의 장방형 필름코팅 정제
캡슐 : 백색~미황색의 과립성 분말이 충전된 상·하 주황색 캡슐제

【약리작용 및 특징】

1. 기전 : 교주의 세포벽합성을 차단함으로써 살균 작용합니다.
2. 메섹신은 반합성 cephalosporin계 항생제로서 내성포도상구균뿐만 아니라 그람음성균이 발생시키는 β - lactamase에 대해서도 강력한 항균력을 지니고 있는 광범위 살균성 항생제입니다.
3. 메섹신은 일반 cephallexin lysinate제제와 항균활성은 같으면서, 더 높은 혈장농도 및 조직농도를 더 지속적으로 유지합니다.
4. 메섹신은 낮은 혈장단백결합율을 가지고 있어서 항균력 및 조직침투력이 우수하고 생체 이용률이 높습니다.

【효능·효과】

- 유효균종
황색포도구균, 표피포도구균, 화농성연쇄구균, 대장균, 클레브시엘라속
- 적응증
편도염, 인두염, 급성 신우신염, 방광염, 전립선염, 피부 및 연조직 감염증, 골 감염증

【용법·용량】

1. 성인
메틸올세팔렉신리시네이트로서 1일 3~4g(약가)을 3~4회 분할 경구투여 한다.
연령(13세 이상), 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
methicillin 내성 staphylococci와 대부분의 enterococci는 cephalosporin계 약물에 내성을 가지고 있다.
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약에 의하여 속의 병력이 있는 환자
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

 - 1) 이 약 또는 세팔계 항생물질에 과민증의 병력이 있는 환자에는 투여하지 않는 것을 원칙으로 하나 부득이 투여할 경우에는 신중히 투여한다.
 - 2) 페니실린계 항생물질에 과민증의 병력이 있는 환자
 - 3) 본인 또는 부모, 형제에 기관지천식, 발진, 두드러기 등의 알레르기 증상을 일으키기 쉬운 체질의 환자
 - 4) 중증의 신장에 환자
 - 5) 경구섭취가 불량한 환자 또는 비경구영양 환자, 고령자, 전신상태가 나쁜 환자(비타민 K결핍증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰한다.)
 - 6) 이 약은 황색5호(선택염료우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여 하십시오. (메섹신정에 한 함)

4. 이상반응

- 1) 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 충분히 관찰하고 불쾌감, 구내이상감, 천명, 어지러움, 변의, 이명, 발한 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 2) 피부 : 드물게 리엘증후군(중독성 표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
- 3) 과민증 : 발진, 두드러기, 홍반, 가려움증, 발열, 림프절종창, 관절통 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 4) 혈액 : 드물게 과립구감소, 호산구증가, 용혈성빈혈, 혈소판감소, 백혈구감소가 나타날 수 있다.
- 5) 간장 : 드물게 황달이 나타날 수 있다. 또한 드물게 GOT, GPT, AL-P의 상승이 나타날 수 있다.
- 6) 신장 : 드물게 급성 신부전 등의 심한 신장장애가 나타날 수 있으므로 정기적으로 검사를 실시하는 등 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 7) 소화기 : 드물게 위막성대장염 등의 합병을 수반하는 심한 대장염이 나타날 수 있다. 복통, 빈번한 설사가 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다. 또한 때때로 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 복통, 식욕부진, 위부불쾌감 등이 나타날 수 있다.
- 8) 호흡기 : 드물게 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X선 이상, 호산구증가 등을 수반하는 간질성 폐렴, PIE증후군 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 부신피질호르몬제 투여 등 적절한 처치를 한다.
- 9) 균교대증 : 드물게 구내염, 칸디다증이 나타날 수 있다.
- 10) 비타민결핍증 : 드물게 비타민 K결핍증상(저프로트롬빈혈증, 출혈경향 등), 비타민 B군 결핍증상(설염, 구내염, 식욕부진, 신경염 등)이 나타날 수 있다.
- 11) 기타 : 드물게 두통, 어지러움, 전신관대감이 나타날 수 있다.

5. 일반적 주의

- 1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현 등을 방지하기 위하여 원칙적으로 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소기간만 투여한다.
- 2) 속 등의 반응을 예측하기 위해 충분히 문진하고 사전에 피부반응 시험을 실시하는 것이 바람직하다.
- 3) 용혈성 연쇄구균 감염증을 치료하는 경우에는 류마티스염 및 사구체 신염의 발생을 예방하기 위하여 최소한 10일 동안 투여하는 것이 바람직하다.

6. 상호작용

고분자량물질의 용액과 혼합하지 않는다.

7. 임부에 대한 투여

임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

8. 임상검사치에 대한 영향

- 1) 테스타스테론반응을 제외한 베네딕트시약, 펄링시약, 클리니테스트에 의한 요당검사에서 위양성이 나타날 수 있으므로 주의한다.
- 2) 직접 쿨스시험 양성이 나타날 수 있으므로 주의한다.

9. 작용상의 주의

- 1) 일반적으로 이 약은 페니실린계에 과민증이 있는 환자에게 유용하지만, 페니실린계와의 교차반응이 드물게 나타날 수 있다.
- 2) 배설의 주경로가 신장의 다른 항생물질과 동시에 투여하면 축적작용이 일어나므로 크레아티닌 청소율을 고려하여 감량투여하여야 한다.
- 3) 이 약은 알칼리성 피크리산 정량법에 있어서 크레아티닌의 정량을 방해하여 수치를 높게 만든다.
- 4) 간헐적인 투석을 받는 환자에게는 매 투석 후 500mg(약가)을 추가로 투여하고, 24시간 이내 1g(약가)까지 추가로 투여할 수 있다.

10. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고, 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 마개를 꼭 막아 보관 하십시오.
- 3) 오용을 막고, 품질의 보존을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 정제 : 실온보관(1~30℃), 캡슐제 : 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 30, 100정 / 30, 100캡슐

【소비자 상담 창구】

제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 전화 및 이메일을 주십시오.

TEL : (02) 3489-6114 홈페이지 : <http://www.hanlim.com>

【반품 및 교환】

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회가 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

본 설명서 작성년월일 (2012. 10. 11)이후의 변경된 내용은 당사 홈페이지나 상담전화를 통하여 확인하실 수 있습니다.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.

설명서 작성년월일 : '12. 10. 11
제품의 사용기한은 외부용기에 표기
P32532-01