

[이 약을 사용하기 전에 첨부된 문서를 주의깊게 읽으시기 바랍니다.
읽으신 후 버리지 마시고, 이 약과 함께 보관하시기 바랍니다.]

전문의약품

분류번호:131



백내장 치료제 포소드[®] 점안액 POSOD[®] Eye Drops



눈은 인체에서 매우 소중한 감각기관의 하나로 노화에 의해 여러가지의 퇴행성 변화를 겪게 됩니다. 백내장은 수정체질환중 수정체 혼탁으로 인한 시력소실을 일으키는 병으로서 노화가 진행됨에 따라 수정체 중심부의 진행성 경화현상과 수정체 캡슐의 수분투과성 증가현상이 계속되어 단백변성을 초래함으로써 수정체의 혼탁을 일으키게 되는 것입니다.

백내장은 자각에 의한 직접적 손상이나 방사선에 의한 손상, 부신피질 출몰제와 같은 약물의 장기투여, 당뇨병, 감염 그리고 유당혈증 등에 의해서 발생되기도 하나 노인성 백내장이 가장 많은 비율을 차지합니다. 65세이상이 되면 대부분의 사람들이 약간의 백내장을 갖게 되며 연령의 증가에 따라 수정체의 영양이 악화되어 증상이 심화됩니다.

포소드점안액은 퇴행성 수정체의 혼탁에 의한 초자체의 불투명, 수정체의 혼탁 및 노인성 백내장 예방 및 치료에 사용되는 무색 투명한 점안액입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1mL 중

요오드화칼륨 (Potassium Iodide)(약전) 3mg

(요오드로서 2.29mg)

요오드화나트륨 (Sodium Iodide)(약전) 3mg

(요오드로서 2.54mg)

첨가제(보존제) :

파라옥시벤조산메틸 (Methyl paraben)(약전) 0.35mg

파라옥시벤조산프로필 (Propyl paraben)(약전) 0.15mg

첨가제 : 히프로멜로오스 2910, 붕산, 붕사, 염화나트륨, 주사용수

【성상】 플라스틱 용기에 든 무색 투명한 액

【효능·효과】

노화·근시·고혈압·당뇨병·점막주위염으로 인한 출혈, 노인성 백내장 초기증상으로서의 렌즈혼탁

【용법·용량】 성인 : 1회 1방울씩 1일 1~3회 점안합니다.

본 제제를 사용하실 때에는 콘택트렌즈를 뺀 상태에서 점적하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 갑상선 기능 이상 환자
- 3) 임부 및 수유부, 소아

2. 부작용

- 1) 국소 : 이 약 투여후 잠시동안 약간의 작열감을 느낄 수 있습니다. 때때로 눈물 분비량이 증가할 수 있습니다.
- 2) 전신 : 이 약은 요오드를 함유하고 있으므로 갑상선 기능항진증을 유발할 수 있으며 여드름 소인이 있는 환자에서 여드름양 효과를 나타낼 가능성이 있습니다.

3. 일반적 주의

- 1) 콘택트렌즈 착용자는 렌즈 제거 후 이 약을 투여하며 투여 후 30분이 경과한 다음에 다시 렌즈를 착용합니다.
- 2) 개봉 후 1개월 이내에 사용 하십시오.
- 3) 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.



4. 적응상의 주의

- 1) 점안용오로만 사용 하십시오.
- 2) 점안시 용기의 입구가 직접 눈에 닿지 않도록 하십시오.
- 3) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 마십시오.
- 4) 사용기간이 경과된 것은 사용하지 않고 개봉 후 1개월이상 경과된 것은 사용하지 마십시오.
- 5) 점안 작용을 최소화하기 위해 이 약 투여후 1~2분간 손가락으로 눈방을 가볍게 눌러주면 좋습니다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.
- 2) 사용 후 즉시 뚜껑을 닫습니다.
- 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관 하십시오.
- 4) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.



【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 10mL

【소비자 상담 청구】

제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 전화 및 이메일을 주십시오.

TEL : (02) 3489-6114

홈페이지 : <http://www.hanlim.com>

【반품 및 교환】

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회가 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

본 설명서 개정년월일 (2012. 07. 18)이후의 변경된 내용은 당사 홈페이지나 상담전화를 통하여 확인하실 수 있습니다.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.

설명서 작성년월일 : '89. 01. 30

설명서 개정년월일 : '12. 07. 18

제품의 사용기한은 외부용기에 표기

P32080-15



제조·판매원

한림제약 주식회사

공장:경기도 용인시 처인구 명문로 2-27(유방동)

<http://www.hanlim.com>

