

[이 약을 사용하기 전에 첨부된 문서를 주의깊게 읽으시기 바랍니다.
읽으신 후 버리지 마시고, 이 약과 함께 보관하시기 바랍니다.]

일반의약품

종합효소소화제

분류번호: 233

다제스[®] 캡슐

DAGES[®] Cap.

다제스[®] 캡슐은 특수공법으로 제조된 백색, 주황색, 녹색의 3가지 필름코팅정제를 분리 함유한 무색투명한 캡슐제로서 소화촉진, 장내가스 제거 촉진 및 이당작용이 있어 각종 소화불량과 장내 가스 형성을 억제시켜 주면서, 동시에 담즙(쓸개즙)분비를 원활하게 해주어 소화효수를 증가시킵니다.

다제스[®] 캡슐은 과식뿐만 아니라 간, 담낭(쓸개), 췌장 등의 소화기관 이상으로 오는 복부팽만감, 상복부불쾌감, 고창(鼓脹)(복부팽만) 및 설사, 지방변 등의 각종 소화불량을 신속히 그리고 체계적으로 치유시켜주며 담낭(쓸개)수축 및 Oddi근 이완에 의한 담즙(쓸개즙) 배설 촉진작용이 있습니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

펩신(Pepsin)(별규)	25mg (17.5 F.U.단위)
파파인(Papain)(별규)	50mg (20 F.U. 단위)
디아스타제(Diastase)(별규)	15mg (1500 F.U.단위)
우르소데옥시콜산(Ursodesoxycholic acid)(약전)	25mg
셀룰라아제 II (Cellulase)(식약청 고시)	15mg
판크레아틴(Pancreatin)(미국약전)	50mg (단백소화력 1250 USP 단위) (전분소화력 1250 USP 단위) (지방소화력 100 USP 단위)
판크레리파아제(Pancrelipase)(미국약전)	13mg (단백소화력 1300 USP 단위) (지방소화력 312 USP 단위) (전분소화력 1300 USP 단위)

첨가제(식약청인정 타르색소) : 황색5호 · 황색203호 알루미늄레이크, 황색5호, 청색1호

【성 상】 백색, 주황색, 녹색의 양면이 불룩한 세가지 필름코팅 정제를 함유하고 있는 무색의 경질캡슐제

【약리작용 · 특징】

1. 각종 음식을 섬유소의 분해 촉진작용, 단백질소화효수 촉진작용, 지방 소화효수 촉진작용, 탄수화물 소화효수 촉진작용을 발휘합니다.
2. 장내가스 제거 촉진작용으로 복부팽만감을 제거시켜 줍니다.
3. 담낭(쓸개)절제수술환자 및 췌장성 소화기능 부전환자의 소화불량을 치유시켜 줍니다.
4. 병후 회복기의 과잉섭취, 지방음식의 과잉섭취로 인한 소화불량을 치유시켜 줍니다.
5. 담즙(쓸개즙) 분비촉진작용으로 인한 지방의 가수분해 및 지방산 분해촉진작용이 있어 간세포내의 지방침착을 억제시킴과 동시에 담즙(쓸개즙)색소의 배설을 촉진시킴으로서 황달을 치유시켜 줍니다.

【효능 · 효과】

1. 위장관성, 췌장성 소화기능 부전
2. 식욕부진, 고창(위 또는 장관내에 가스가 충만한 것), 지방변증, 장이상으로 인한 이상 발효성 소화불량
3. 담낭(쓸개) 절제수술환자의 소화불량
4. 병후 회복기의 과잉섭취, 지방음식의 과잉섭취
5. 담즙(쓸개즙)분비 부전
6. 담석증, 담낭염(쓸개염), 담관염(쓸개관염), 황달

【용법 · 용량】

성인 1회 1~2캡슐, 1일 3회 식후에 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 각 성분에 과민 반응을 일으키는 환자
- 2) 급성 간염 환자
- 3) 담도(쓸개길) 폐쇄 환자
- 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여 하십시오.

이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여 하십시오.

3. 부작용

구내불쾌감, 가려움, 구역, 구토, 설사, 연변(붉은변)이 나타날 수 있습니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 10, 500캡슐

【소비자 상담 창구】

제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 전화 및 이메일을 주십시오.

TEL : (02) 3489-6114 홈페이지 : <http://www.hanlim.com>

【반품 및 교환】

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회가 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

본 설명서 개정년월일 (2012. 10. 11)이후의 변경된 내용은 당사 홈페이지나 상담전화를 통하여 확인하실 수 있습니다.

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 오용(잘못사용)을 피하고 품질의 보존을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

설명서 작성년월일 : '89. 07. 11

설명서 개정년월일 : '12. 10. 11

제품의 사용기한은 외부용기에 표기

P32062-18

제조 · 판매원
 **한림제약주식회사**
공장: 경기도 용인시 처인구 영문로 2-27(유방동)
<http://www.hanlim.com>