

[이 약을 사용하기 전에 첨부된 문서를 주의깊게 읽으시기 바랍니다.
읽으신 후 버리지 마시고, 이 약과 함께 보관하시기 바랍니다.]

일반의약품
분류번호 : 329

자양강장제

호르반® HORBAN®

내복액
Oral Solu.

호르반® 내복액은 사슴의 어린뿔인 녹용의 유효성분인 루론딘, 살모사의 추출성분인 반비틴크 그리고 일벌의 인두선에서 분비되는 로알제리에 비타민 B군등의 영양소가 복합 처방된 제제로서 허약한 체질, 피로를 느끼는 분, 병중·병후의 회복기 환자, 발열성·소모성 질환 환자, 식욕부진 및 영양 장애 환자 등에게 효과가 높은 자양강장제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1병(30mL)중

루론딘 (Rulondin)(별규)	30mg
반비틴크 (Vanbi Tinc)(1→5) (별규) (시스타치오닌으로서 0.01mg)	100mg
로알제리 (Royal Jelly)(별규) (10-HDA로서 0.7mg)	50mg
티아민염산염 (Thiamine HCl)(K.P.)	5mg
리보플라빈포스페이트나트륨 (Riboflavin Sodium Phosphate)(K.P.)	1mg
피리독신염산염 (Pyridoxine HCl)(K.P.)	3mg
니코틴산 아미드 (Nicotinamide)(K.P.)	10mg
카페인무수물 (Caffeine)(K.P.)	10mg
타우린 (Taurine)(KPC)	100mg
파라옥시벤조산에틸 (Ethylparaben)(K.P.)	3mg
동물유래성분 : 루론딘(사슴, 녹용), 반비틴크(반비, 껍질과 내장을 제거한 전체), 로알젤리(벌, 분비물)	

【성상】 갈색병에 든 암적색의 내복액제

【약리작용·특장】

녹용으로부터 추출한 유효성분인 루론딘에는 구성물질로서 녹용(harts horn salt), Glutin, Chondrin, Collagen, 인산칼슘, 단백질, 마그네슘, 난포호르몬인 Oestron, Pantocrin(인지질, 레시틴, Cholesterin, 중성지방 등) 등이 함유되어 있습니다. 예로부터 한방에서는 강장, 강정, 진통, 보기혈(補氣血), 건근골(建筋骨) 등으로 총체적 의미로서의 보정 강장제로 일컬어져 왔습니다. 껍질과 내장을 제거하여 건조한 살모사의 유효성분을 알코올로 추출하여 얻은 반비틴크는 구성성분으로 팔미탄산, 스테아린산, 타우린, 콜레스테롤, 수종의 아미노산, 비타민 B군류 및 Citrovorum factor등을 함유하고 있습니다. 로알제리는 일벌이 꿀을 먹고 대사한 후 인두선에서 분비되는 크립상의 물질을 일컫는 말로서 예로부터 강장, 강정의 약으로 쓰여졌으며 구성성분으로 단백질, 탄수화물, 지질, 미네랄 등을 함유하고 있습니다. 즉 녹용, 살모사로부터 추출한 루론딘, 반비틴크와 로알제리를 함유한 호르반®내복액은 신진대사를 촉진하고 고단위 영양분을 공급하여 자양강장제로서 작용을 나타내며 육체피로, 식욕부진, 허약체질에 유효하고 특히 발열성 소모성 질환을 앓고 있는 환자에게 고급 열량원 및 체력 보강제로서 효과적입니다.

【효능·효과】

자양강장·육체피로·병중병후·발열성 소모성 질환·식욕부진·영양 장애 등의 경우의 영양보급, 허약체질 (다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 나타날 수 있습니다.)

【용법·용량】 성인 1회 1병(30mL). 1일 1~2회 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 이 약에 함유되어 있는 인공 감미제 “아스파탐”은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여할 것 (아스파탐을 첨가제로 사용하는 경우)
- 로알제리가 함유된제제 사용으로 천식 및 심각한 알레르기증상등의 부작용이 나타났다는 외국의 보고가 있으므로 천식 및 알레르기환자는 복용하지 말것. (로알제리를 첨가제로 함유하는 경우)

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

당뇨병 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

이 약은 카라멜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. (카라멜을 첨가제로 함유하는 경우)

4. 부작용

- 1) 고용량투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상, 과요산혈증, 간손상을 일으킬 수 있다. (니코틴산아미드 함유제제)
- 2) 피리독신을 1일 50mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상이 나타날 수 있다 (비타민 B6 함유제제).
- 3) 이 약의 투여에 의해 부작용이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 지킬것
- 2) 장기간 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 본 제품을 전자레인지에 넣고 데우지 마십시오.
- 4) 개봉시 무리한 힘을 가하지 마십시오.

6. 임상검사치에의 영향

뇨의 황변으로 임상검사치에 영향을 줄 수 있다. (비타민 B2 함유제제)

7. 적응상의 주의

이 약은 경구용으로만 사용하고 주사용으로는 사용하지 말것.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오염을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】

차광, 밀봉용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】

30mL × 10, 30병

【소비자 상담 창구】

제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 전화 및 홈페이지 1:1 상담을 이용해주시십시오.

TEL : (02) 3489-6114

홈페이지 : <http://www.hanlim.com>

【반품 및 교환】

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의 약품은 공정거래위원회가 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

본 설명서 개정년월일 (2014. 04. 10)이후의 변경된 내용은 당사 홈페이지나 상담전화를 통하여 확인하실 수 있습니다.

생약제제이므로 침전이 간혹 생길 수 있으나 약효에는 변화가 없으므로 잘 흔들어 복용하시기 바랍니다.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.

설명서 작성년월일 : '93. 08. 27

설명서 개정년월일 : '14. 04. 10

제품의 사용기한은 외부용기에 표기

P32087-21