

클레신비액 2%

CLESIN Nasal soln.
크로모글리크산나트륨 (sodium Cromoglicate)

클레신 비액 2%는 비만세포의 안정화를 꾀하여 알레르기를 일으키는 Histamine, SRS-A등의 유리를 방지함으로써 알레르기성 비염의 예방 및 치료에 효과를 나타냅니다.

【원료약품 및 그 분량】 100mL 중
크로모글리크산나트륨 (sodium Cromoglicate)(약전) 2000mg
첨가제(보존제) 벤잘코늄염화물(Benzalkonium Chloride)(약전) 10mg

【성 상】 무색 내지 미황색의 투명한 액체

【약리작용 · 특징】

- 1. 클레신비액은 특정항원에 노출된 후 감작되는 비만세포의 탈과립을 억제함으로써 Type I 과민반응에 관련된 Histamine과 SRS-A를 포함한 매개물질의 유리를 방지하여 알레르기성 비질환을 효과적으로 치료합니다.
- 2. 클레신비액은 비감작된 비만세포의 감응성도 감소시켜 알레르기 반응을 억제함으로써 알레르기성 비염을 예방하는 효과가 뛰어나며 Type II 과민반응을 억제시키는 작용도 있습니다.
- 3. 클레신비액은 직접적인 항히스타민, 항세로토닌 작용을 나타내는 항히스타민제와는 다른 특이한 약리기전으로 알레르기 질환을 치료하므로, 일반 항히스타민제와 같은 부작용을 나타내지 않고 우수한 치료 효과를 나타냅니다.

【효능 · 효과】 알레르기성 비염

【용법 · 용량】

성인 : 1회 각 비강(콧속)에 한번씩, 1일 6회 (기상시, 하루중 3시간마다 4회, 취침전) 분무하십시오 (뿌리십시오).

연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

■ 클레신비액 2% 사용방법

부작용 위험성을 최소화하면서 최대의 치료효과를 얻기 위해서는 적절한 용량을 사용하는 것이 매우 중요하며, 치료 시작 전에 용법·용량과 사용법을 충분히 숙지하여야 합니다.
처음 사용시 약액이 잘 분사되는지 확인이 필요합니다. 그림 2와 같이 병을 쥐고, 검지와 중지로 펌프를 힘차게 10회 정도 눌러주어 약액이 균일하게 분사되는지 확인하시기 바라며, 직전 사용일이 일주일 이상 지난 경우에는 동일한 방법으로 재확인하여야 합니다. 약액이 잘 분사되지 않는 경우에는 분사기의 입구를 물로 깨끗이 씻고 건조시킨 후 사용하시면 되며, 매번 사용 전에는 용기를 잘 흔든 후 아래 그림 및 사용법대로 사용하시기 바랍니다.



1. 용기를 잘 흔들어 준 후, 제일 위의 연청색 뚜껑을 엽니다.



2. 코를 풀어 콧 속을 깨끗이 한 후, 한쪽 코를 막고 고개를 앞으로 살짝 숙인 후 그림 2와 같이 병을 잡은 상태(손바닥과 엄지 손가락으로 병을 전 상태에서 검지와 중지로 펌프를 누름)에서 그림 3과 같이 코를 막지 않은 다른 쪽 콧구멍으로 분사구를 부드럽게 깊숙히 넣은 후 펌프를 세게 눌러 분사합니다. 분사할 때는 펌프를 확실하게 한 번씩만 눌러주시기 바랍니다.
* 분사시 비중격에 직접 분사되지 않도록 하기 위하여 왼쪽 콧속에 분사할 때는 오른손으로, 오른쪽 콧속에 분사할 때는 왼손으로 분사하십시오.



3. 분사한 후에는 코로 숨을 가볍게 들이마신 다음, 입으로 숨을 내뿜습니다.
4. 막았던 다른 콧구멍 속에도 같은 방법으로 분사한 후, 코로 숨을 가볍게 들이마신 후, 입으로 숨을 내뿜습니다.

5. 마지막으로 연청색 뚜껑을 닫습니다.

■ 용기의 청결관리


클레신비액 2%의 펌프가 잘 작동되려면 용기를 주기적으로 깨끗이 씻어 청결히 관리하는 것이 중요합니다. 어떠한 경우에도 분사구의 구멍을 찢어서는 안됩니다.



1. 연청색 뚜껑을 열고 흰색 분사기를 살짝 위로 밀어서 펌프에서 분사기를 분리하십시오(그림 4).

2. 차가운 수도물로 청색 뚜껑과 분사기를 씻는데, 특히 분사구 부위를 깨끗이 씻은 후 물기를 제거하고 건조시킵니다.

3. 원래대로 펌프를 분사기에 끼우고 난 후 연청색 뚜껑을 닫아 보관하십시오.



4. 사용 전에는 시험분사하여 약액이 균일하게 잘 분사되는지 재확인하시기 바랍니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
이 약에 과민증의 병력이 있는 환자

2. 부작용
재채기, 비(鼻)내자극감, 작열감(화끈감), 두통, 구내 이화감, 비출혈, 후비루, 발적(충혈되어 붉어짐), 호흡곤란, 혈관부종, 관절통 및 관절부종, 가려움, 두드러기, 발진, 기침 및 천식음, 혈청질혈, 동맥주위염, 다근염, 심막염, 광선성 피부염, 박리성 피부염, 말초신경염, 네프로제 및 아주 드물게 아나필락시가 나타날 수 있습니다.

3. 일반적 주의
1) 코에 분무 직후 자극감이나 재채기가 일시적으로 나타날 수 있으나 대부분의 경우 사용을 중지할 필요는 없습니다.
2) 이 약이 담즙 또는 신장을 통해 배설되므로 신장 또는 간장애 환자는 감량(줄임) 또는 투여를 중지하는 것이 바람직합니다.

4. 상호작용
레세르핀 제제, β -메틸도파 제제 등의 혈압 강하제에는 부작용으로 비폐(코막힘)가 나타나는 수도 있습니다. 이러한 혈압강하제를 투여 중인 알레르기성 비염의 환자에게 투여하면 비폐(코막힘)증상에 대한 이 약의 효과가 은폐될 수 있으므로 관찰을 충분히 하면서 투여하십시오.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 동물실험(토끼, 마우스)에서 모체독성이 나타나고 대량 주입시 태자흡수 및 체중감소 등의 태자독성이 나타났다는 보고가 있으므로 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 투여하지 않는 것이 바람직합니다. 특히, 3개월 이내의 부인에게는 투여하지 마십시오.
2) 수유부에 투여시 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.

6. 적응상의 주의
1) 전용 분무기를 이용해 분무 흡입 하십시오.
2) 비강내 분무용으로만 사용한다.

7. 저장상의 주의사항
1) 일단 개봉한 것은 1개월 이내에 사용하십시오.
2) 차광·실온보존하십시오.

【저장방법】 15~30℃에 보관, 차광기밀용기

【포장단위】 10mL /병

【소비자 상담 창구】
제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 전화 및 홈페이지 1:1 상담을 이용해주십시오.
TEL : (02) 3489-6114 홈페이지 : <http://www.hanlim.com>

【반품 및 교환】
본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회가 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

본 설명서 개정년월일 (2013. 07. 25)이후의 변경된 내용은 당사 홈페이지나 상담전화를 통하여 확인하실 수 있습니다.

어린이의 손이 닿지 않는곳에 보관 하십시오.	설명서 작성년월일 : '91. 08. 01 설명서 개정년월일 : '13. 07. 25 제품의 사용기한은 외부용기에 표기 P32083-12
-------------------------------------	---