

[이 약을 사용하기 전에 첨부된 문서를 주의깊게 읽으시기 바랍니다.
읽으신 후 버리지 마시고, 이 약과 함께 보관하시기 바랍니다.]

일반의약품

분류번호:131



나조린 점안액

NAZORIN Eye Drops



나조린점안액은 항히스타민제와 충혈제거제의 복합효과로 알러지성·염증성안질환이나
감염으로 인한 눈의 자극증상 및 충혈을 효과적으로 제거합니다.

【원료약품 및 그 분량】 1mL 중

말레인산페니라민(Pheniramine maleate)(영국약전)	3mg
나파졸린염산염(Naphazoline HCl)(약전)	0.25mg
첨가제(보존제) : 벤잘코늄염화물(Benzalkonium Chloride)(약전)	0.10mg
첨가제 : 에데트산나트륨수화물, 붕산, 붕사, 염화나트륨, 수산화나트륨, 염산, 주사용수	

【성상】 플라스틱 용기에 든 무색 투명한 액체

【약리작용·특장】

1. 눈의 염증, 가려움, 자극증상 제거효과

나조린점안액에는 항히스타민제인 pheniramine maleate와 혈관수축제인 naphazolin hydrochloride가 복합처방되어 눈의 염증, 가려움, 각종 자극증상 및 충혈을 효과적으로 개선합니다.

2. 높은 안정성

나조린점안액은 눈물과 등장성 및 같은 pH를 갖도록 제조하였으며, 안정성이 높은 제제입니다.

【효능·효과】 1. 안자극·충혈의 완화 2. 염증성 안질환

【용법·용량】 1회 1~2방울, 1일 4회 점안(눈에 넣음)하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약에 과민증의 병력이 있는 환자
- 2) 폐쇄각 녹내장 환자 및 그 소인이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) MAO 저해제(억제제)를 투여중인 환자(교감신경 흥분제를 투여시 중증의 고혈압성 발증을 나타낼 수 있습니다.)
- 2) 유아 및 소아(중추신경 억제로 인한 혼수를 일으킬 수 있고 현저한 체온하강을 일으킬 수 있습니다.)
- 3) 심부정맥 등 중증의 심혈관 질환 환자
- 4) 혈압조절이 잘 되지 않는 고혈압 환자
- 5) 당뇨병성 케토아시도시스가 될 가능성이 있는 당뇨병 환자

3. 부작용

동공산대, 안압상승 등의 부작용이 나타날 수 있으며, 고혈압, 심박부정, 과혈당증 등 점막 흡수에 의한 전신 부작용이 나타날 수 있습니다.



4. 적용상의 주의

- 1) 점안(눈에 넣음)용으로만 사용하십시오.
- 2) 점안(눈에 넣음)시 용기의 입구가 직접 눈에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 3) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는한 공동으로 사용하지 마십시오.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.



【저장방법】 차광기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 10, 12, 15mL/병

【소비자 상담 창구】 제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 전화 및 이메일을 주십시오.
TEL : (02) 3489-6114 홈페이지 : <http://www.hanlim.com>

【반품 및 교환】 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회가 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

본 설명서 개정년월일 (2012. 03. 26)이후의 변경된 내용은 당사 홈페이지나 상담전화를 통하여 확인하실 수 있습니다.

- 개봉 후 1개월 이내에 사용하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.

설명서 작성년월일 : '93. 06. 10

설명서 개정년월일 : '12. 03. 26

제품의 사용기한은 외부용기에 표기

P32111-19

제조·판매원
 **한림제약주식회사**
공장: 경기도 용인시 처인구 영문로 2-27(유방동)
<http://www.hanlim.com>

