

[이 약을 사용하기 전에 첨부된 문서를 주의깊게 읽으시기 바랍니다.
읽으신 후 버리지 마시고, 이 약과 함께 보관하시기 바랍니다.]

일반의약품

분류번호:132

분무식 비점막 습윤제

엔클[®] 비액

ENCLE[®] Nasal Soln.

염화나트륨(Sodium Chloride)

엔클비액은 섬세한 비점막의 생리적 습윤(습기찬)상태를 회복시킴으로써 만성부비동염, 감기, 건조, 비출혈제의 과용, 알레르기, 경미한(가벼운) 비출혈, 기타 경미한(가벼운) 비자극에 기인한 비점막의 건조 및 화농(끓음)상태를 개선하여 줍니다. 또한 필요할 때마다 안심하고 사용할 수 있습니다.

【원료약품 및 그 분량】100mL 중

염화나트륨(Sodium Chloride)(약전) 650mg
첨가제(보존제) : 벤잘코늄염화물(Benzalkonium Chloride)(약전) 10mg

【성 상】무색투명한 액체

【약리작용 · 특징】

1. 엔클비액은 만성부비강염, 알레르기, 비출혈제의 과용 등에 기인한 비점막의 건조 및 화농(끓음)상태를 신속히 개선시켜 줍니다.
2. 엔클비액은 필요할 때마다 안심하고 사용할 수 있습니다.
3. 엔클비액은 섬세한 비조직을 자극하지 않도록 적정 pH 및 등장성을 갖도록 특별히 처방된 제제이므로 따갑거나 작열감(화끈감) 또는 자극이 없습니다.
4. 엔클비액은 비점막에 자극을 주지 않고 유 · 소아에도 사용할 수 있는 매우 안전한 제제이며, Spray식으로 되어 있어 적용이 편리합니다.

【효능 · 효과】비점막 건조 증상의 완화 (다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 나타날 수 있습니다.)

【용법 · 용량】성인 : 증상에 따라 필요시 각 비강(코안)에 2방울씩 점적(2회 분무)하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

벤잘코늄염화물에 과민증 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 지금까지 점비약에 대하여 알레르기 증상(발진, 발적(총혈되어 붉어짐), 종창(부기), 자극감 등)을 일으킨적이 있는 사람
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 일반적 주의

- 1) 이 약은 점비용(비강내 분무용)으로만 사용하십시오.
- 2) 될 수 있는 한 한사람 개인용으로만 사용하십시오.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 오용(잘못사용)을 피하고 품질을 보존하기 위해 다른 용기에 옮겨 담지 않도록 하십시오.
- 3) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관 하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 40mL

【소비자 상담 창구】 제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 전화 및 홈페이지 1:1 상담을 이용해주시십시오.

TEL : (02) 3489-6114 홈페이지 : <http://www.hanlim.com>

【반품 및 교환】

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회가 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

본 설명서 개정년월일 (2013. 12. 19)이후의 변경된 내용은 당사 홈페이지나 상담전화를 통하여 확인하실 수 있습니다.

어린이의 손이 닿지 않는곳에 보관 하십시오.

설명서 작성년월일 : '94. 05. 26

설명서 개정년월일 : '13. 12. 19

제품의 사용기한은 외부용기에 표기

P32132-14

제조의뢰·판매원
 **한림제약주식회사**

공장:경기도 용인시 처인구 영문로 2-27

<http://www.hanlim.com>

제조원
 **성광제약(주)**

충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 47