

[이 약을 사용하기 전에 첨부된 문서를 주의깊게 읽으시기 바랍니다.
읽으신 후 버리지 마시고, 이 약과 함께 보관하시기 바랍니다.]

전문약품

퀴논론계 항균제

분류번호:131



퀴노비드[®] 점안액

QUINOVID[®] Eye Drops

오픈록사신 (Ofloxacin)



퀴노비드점안액은 Fluoroquinolone계인 Ofloxacin을 주성분으로 하는 점안제로서 그람 양성균, 그람 음성균 및 혐기성균에 대하여 광범위한 항균스펙트럼을 갖습니다.

【원료약품 및 그 분량】 1mL중

오픈록사신(Ofloxacin)(미국약전) 3mg

첨가제(보조제)

벤잘코늄염화물(약전) 0.025mg

첨가제 : 염화나트륨, 염산, 수산화나트륨, 주사용수

【성상】 미황색 내지 담황색의 등명한 액

【약리작용 · 특징】

1. 작용기전: Ofloxacin은 세균의 DNA합성을 특이적으로 저해하고 살균작용(Bactericidal)을 나타내며, MIC 농도에서 용균작용이 인정됩니다.
2. 항균 스펙트럼: Ofloxacin은 Penicillinase-producing or nonproducing 및 methicillin resistant Staphylococci와 같은 그람양성균과 대부분의 그람음성호기성균(Enterobacteriaceae, P. aeruginosa)에 대하여 뛰어난 항균력을 발휘하며, 혐기성균에 대해서도 항균활성을 갖습니다.

【효능 · 효과】

(유효균종)

본제 감수성의 포도구균속, 연쇄상구균속, 폐렴구균, 장구균속, 소구균속, 모락셀라속, 간균속, 클렙시 엘라속, 세라치아위, 프로테우스속, 모로가넬라 모로가니, 프로비덴시아속, 헬코박테리아속[인플루엔자균, 헤모필루스 애집티우스 (Koch-Weeks bacillus)], 슈도모나스속, 녹농균, 박테로이데아 세파시스, 스테노 트로피모나스(산도모나스)알도필리아, 아시네토박터속, 프로피오니박테리움아크네스

(적응증)

안검염, 누낭염, 맥립종, 결막염, 검편선염, 각막염(각막궤양을 포함), 안과 수술 전후의 무균화 요법

【용법 · 용량】

1회 1방울 1일 3회 점안(도포)하십시오.

증상에 따라 적절한 증감하십시오.

수술후 감염증 : 수술전 2일간 1일 5회 점안, 수술 당일에는 수술의 시각, 수술의 종류에 따라 적의 점안하고 수술 직후에 1회 점안, 이후는 포대교환시 매회 점안하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

이 약 및 퀴논론계 항생물질에 과민증 병력이 있는 환자

2. 부작용

- 1) 속 : 드물게 속악 증상(구역, 사지냉감, 호흡곤란 등)이 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
- 2) 과민증 : 드물게 심혈관계 허탈, 의식소실, 혈관 부종(인두, 후두, 얼굴), 기도폐쇄, 호흡곤란, 발진, 두드러기, 가려움증, 안검발적 · 부종, 피부발적, 결막출혈 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하십시오.
- 3) 눈 : 때때로 일시적인 작열감 등 자극감, 불쾌감이, 때때로 자통, 발적, 소양감, 화학적 결막염 및 각막염, 안구주위 및 안면 부종, 이물감, 눈부심, 시력불명, 눈물, 건조감, 안통, 드물게 어지러움, 비안성 표출각막염 등의 각막장애 및 독성표피괴사로까지 악화되는 스티븐스-존스 증후군이 일어날 수 있으므로 이런 증상이 나타나는 경우 투여를 중지하십시오.



4) 기타 : 청각장애, 때때로 자극증상이 일어나는 경우가 있습니다.

3. 일반적 주의

- 1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현 등을 방지하기 위하여 원칙적으로 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소 기간만 투여하십시오.
- 2) 이 약의 장기 사용은 진균을 비롯한 비감수성균의 과잉 성장을 초래할 수 있으므로 장기 사용하지 않습니다. 증복 감염시 투여를 중지하고 다른 요법으로 대처하십시오.

4. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
- 2) 수유부에 투여할 경우에는 수유를 중단하거나 이 약의 투여를 중지하십시오.

5. 소아에 대한 투여

1세 미만의 영아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않습니다.

6. 적응상의 주의

- 1) 점안용으로만 사용하십시오.
- 2) 점안시 용기의 입구가 직접 눈에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 3) 오염을 방지하기 위해 물 수 있는 한 공동으로 사용하지 마십시오.

7. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 마개를 꼭 막아 보관하십시오.
- 3) 오염을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 5mL/병

【소비자 상담 창구】

제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 전화 및 홈페이지 1:1 상담을 이용해 주십시오.
TEL : (02) 3489-6114 홈페이지 : <http://www.hanlim.com>

【반품 및 교환】

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회가 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

본 설명서 개정년월일 (2013. 07. 02)이후의 변경된 내용은 당사 홈페이지나 상담전화를 통하여 확인하실 수 있습니다.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.

설명서 작성년월일 : '94. 05. 09

설명서 개정년월일 : '13. 07. 02

제품의 사용기한은 외부용기에 표기
P32143-16

제조·판매원
 **한림제약주식회사**
공장: 경기도 용인시 처인구 영문로 2-27(유방동)
<http://www.hanlim.com>