

[이 약을 사용하기 전에 첨부된 문서를 주의깊게 읽으시기 바랍니다.
읽으신 후 버리지 마시고, 이 약과 함께 보관하시기 바랍니다.]

전문의약품

속효성진경제

분류번호:124

플론® 정

PHLON Tab.

플로로글루신 (Phloroglucin)

플론 정은 속효성진경제로서 각과영역의 통증성 평활근경련에 대하여 우수한 진경효과를 발휘하며, 타 진경제에서 흔히 나타나는 구갈, 시력조절장애 및 위산분비 억제 등의 부작용이 거의 없습니다.

[원료 약품 및 그 분량] 1정 중

플로로글루신 (Phloroglucin)(식약청고시)..... 80mg

[성 상] 흰색의 원형 정제

[약리작용 · 특징]

1. 플론 정은 복용 즉시 위장관에서 완전 흡수되어 신속한 진경효과를 발휘합니다.
2. 플론 정은 소량의 우유 또는 물에 녹여 투여하거나, 설하투여도 가능하므로 소아·노인 환자 및 연하곤란 환자의 투여에도 적합한 제제입니다.
3. 플론 정은 항콜린성 진경제에서 흔히 볼 수 있는 구갈(口渴), 수정체 조절장애 및 위액분비억제 등의 부작용이 거의 없는 제제입니다.

[효능 · 효과]

1. 비뇨기계의 경련 및 통증 : 신염성 산통
2. 소화관 및 담도계의 기능장애에 의한 통증
3. 부인과의 경련성 통증
4. 임신중 수축의 보조치료

[용법 · 용량]

성인 : 플로로글루신으로서 1회 160mg을 물한컵에 녹이거나 설하에 넣어 증상발현시에 경구투여 하십시오.

소아 : 1회 80mg을 물 한컵에 녹여 1일 2회 투여 하십시오.

연령, 증상에 따라 적절히 증감 하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약에 과민증 환자

2. 부작용

- 1) 소화기계 : 드물게 구역, 구갈 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량, 휴약 등의 적절한 처치를 하십시오.
- 2) 피부 : 알레르기반응이 나타날 수 있습니다.
- 3) 기타 : 드물게 기분불량, 복시 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량, 휴약 등의 적절한 처치를 하십시오.

3. 상호작용

이 약은 진경작용을 나타내므로 모르핀 또는 그 유도체와 같은 진통제와는 병용투여하지 않는 것이 바람직 합니다.

4. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 동물실험에서 태자독성 및 기형발생은 나타나지 않았으나 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인(특히 초기 3개월)에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
- 2) 수유중에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

5. 일반적 주의

1) 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.

6. 저장상의 주의 사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 마개를 꼭 막아 보관 하십시오.

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30, 300 정

【소비자 상담 창구】 제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 전화 및 이메일을 주십시오.

TEL : (02) 3489-6114

홈페이지 : <http://www.hanlim.com>

【반품 및 교환】 본 제품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 사용(유효)기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품이 발견될 경우 구입한 약국 또는 본사를 통하여 교환하여 드립니다.

이 약은 Tripotassium dicitrate bismuthate, Ranitidine hydrochloride 제제와 혼재시 변질의 우려가 있으니 별도 포장 바랍니다.

본 설명서 개정년월일 (2010. 05. 26)이후의 변경된 내용은 당사 홈페이지나 상담전화를 통하여 확인하실 수 있습니다.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.

설명서 작성년월일 : '95. 01. 03

설명서 개정년월일 : '10. 05. 26

P32147-09

제조·판매원



한림제약주식회사

공장 : 경기도 용인시 처인구 유방동 1007

<http://www.hanlim.com>