

젠 텔[®] 정 400mg

(알벤다졸)

®GlaxoSmithKline의 등록상표

(642 : 구충제)

[성분 · 함량] : (1정 중) 알벤다졸(U. S. P.) 400mg

※첨가제(타르색소):황색5호

[성 상] : 연한 오렌지색의 타원형 제피정

[작용 · 특징] : 동물 및 인체 실험에서 알벤다졸은 성충에 대한 살충뿐만 아니라 살충란, 살충충작용을 갖는 것으로 나타났으며 그 이전은 기생충의 glucose 섭취를 차단하여 에너지 공급이 고갈되어 운동성이 저하되고 뒤이어 살충효과를 가져오게 됩니다.

인체내에 경구투약후 알벤다졸은 흡수가 잘되지 않으며(5%이하) 알벤다졸의 구충효과는 거의 장내에서 이루어지는 것으로 생각됩니다. kg당 6.6mg 투약후 약30분에서 2시간 후 주대사물질인 설폭사이드의 푸라스마내 농도는 $0.25\mu\text{g}/\text{mL}$ - $0.30\mu\text{g}/\text{mL}$ 이며 그 반감기는 30분~8시간입니다. 대사물질은 대부분이 뇨를 통해서 배설됩니다.

[효능 · 효과] : 회충, 요충, 십이지장충, 편충, 아메리카 구충, 분선충의 감염 및 이들 혼합감염의 치료

[용법 · 용량]

성인 및 2세이상의 유 · 소아

1) 회충, 요충, 십이지장충, 편충, 아메리카 구충 : 400mg을 1회 복용합니다. 2세이상의 유 · 소아의 요충증은, 200mg을 1회 복용하고 7일 후 200mg을 반복 복용할 수 있습니다.

2) 분선충 : 1일 1회 400mg을 3일간 복용합니다.

3) 편충의 중증(심한증상) 혼합 감염시 : 1일 1회 400mg을 3일간 복용합니다.

※ 씹거나 소량의 물로 복용할 수 있으며 식사를 중단하거나 하제(설사약)를 쓰는 등의 특별한 과정은 필요없습니다.

※ 치료 3주 후 검사를 하여 치료되지 않았으면 경우에 따라 2차 복용을 실시할 수 있습니다.

※ 그림과 같이 정제포장의 불룩한 부분을 화살표 방향으로 누르고 알약만 꺼내 복용합니다. 이 때 실수로 알루미늄 포장을 함께 복용하는 일이 없도록 합니다.



[사용상의 주의사항]

1. 경고

이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에게는 투여하지 마십시오

* 1일 허용량 제한: 아스파탐 함량을 WHO권장량(40mg/kg/1일)이하로 조정(가능한 한 최소량으로 사용)합니다. 60Kg 성인: 1일 최대복용량 2.4g

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

1) 이 약 및 이 약 구성 성분에 과민반응 환자

2) 임부

3) 2세 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)

4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose

intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여(복용)하면 안됩니다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
테오필린 : 테오필린의 대사를 억제할 수 있습니다.
4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기전에 의사 및 약사와 상의하십시오.
이 약이 모유로 이행되는지에 관해서는 알려진 바 없으나, 이 약 복용시에는 수유를 중단하는 것이 좋습니다.
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군), 다형홍반이 나타날 경우 투여(복용)를 중지하고 적절한 처치를 실시합니다.
 - 2) 구역, 구토, 속쓰림, 설사 상복부 또는 복부(배부분) 통증 등의 위장관 장애 또는 두통 및 어지러움이 나타날 수 있습니다.
 - 3) 드물게 발열, 발진, 전신 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 두드러기 등이 나타났다는 보고가 있습니다.
 - 4) 가역적인(회복 가능한) 탈모증이 나타날 수 있습니다.
6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 이 약 사용 전에는 반드시 임신 중이 아님을 확인한 후에 사용하십시오. 임신초기 동안에 이 약의 투여(복용)를 피하기 위해서 가임연령의 여성(임신가능성 있는 여성)은 생리 첫 주 동안 또는 임신 테스트에서 음성인 후 나타날 후에 치료를 시작하십시오.
 - 2) 임상검사치에의 영향 : 때때로 가역적인(회복 가능한) 백혈구 수의 감소를 유발할 수 있고, 과도한 처방시 범혈구 감소증 및 간효소치 이상을 유발 할 수 있습니다.
 - 3) 프라지판텔이 알벤다졸 활성대사체의 혈장농도를 증가시킨다는 보고가 있습니다.
 - 4) 과량투여(복용) 했을 경우 대증요법(증상별로 치료하는 방법)(위세척) 및 일반적인 지지 요법을 사용합니다.
7. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선의 피하여 건냉한 곳(건조하고 시원한 곳)에 실온보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못 사용) · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

[저장 방법] : 밀폐용기보관

[포장 단위] : 1정(1회용)

- ※ 이 의약품은 KGMP(우수의약품제조관리기준)적격업체 의약품으로 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품 일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 최종 개정일자(2010년 06월 17일) 이 후 변경된 내용은 소비자 상담실 (02-834-2607)에서 확인 하실 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) →「정보마당」→「의약품등 정보」를 참조하세요.
- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청 (이지드럭→보고마당→안전성보고→의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- ※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.

문안작성년월일 : 1990. 12. 17

문안개정년월일 : 2010. 06. 17



기술제휴



GlaxoSmithKline