

소론도[®]정
(프레드니솔론)

분류번호 : 245(부신희르몬제)

【원료약품 및 분량】1정 중

- *첨가제: 유당수화물, 옥수수전분, 스테아르산, 스테아르산마그네슘

【성 상】 흰색의 원형 정제

앞면	뒷면
	

【효능·효과】

2. 내분비성 : 갑상성 및 속담성 부신기능저하증, 항산화 부신기능상승증, 양에 수반된 갑상선종양, 비하중성 갑상선암
3. 루피티스 증상
 - 급성질환은 의학적 병자(가) 위한 단기투여용 보조요법으로서 다음의 질환 : 류마티스관 관절염(연소성 루마티스관 관절염을 포함), 골관절 척추염
 - 4. 고혈압성
 - 5. 당뇨병 및 기타 유전적으로 필요한 다음의 질환 : 전신성 홍반성 루푸스, 전신성 피부관절(다발성 근관), 급성 루피티스성 심염
 - 6. 피부 질환 : 전신성, 수포성 피부관절 피부염, 종종 홍반성 홍반(스티븐스-존슨 증후군), 종종 간선, 종종 자루성 피부관, 골관절염
 - 7. 일과루피스 질환
 - 8. 종종 일과루피스질환으로서 일관적인 치료로는 반응이 없는 다음의 질환 : 기관지 천식, 접촉성 피부염, 이차성 피부부, 계절성 알레르기성 비염, 천식, 신경, 약독 과민증
 - 9. 안과 질환
 - 10. 종종 급성성 일과루피스 또는 만성성 안과 질환 : 눈 및 부속기관에 관련되는 다음의 질환 : 홍채염, 약독염, 후부의 신생성 망막염, 시신경, 일과루피스 결막염, 각막염
 - 11. 위장관계 질환
 - 12. 장기간 투여를 넘기 위한 다음의 질환 : 폐양성 대장염, 국한성 장염
 - 13. 호흡기 질환 : 홍반성 루피티스, 전신성 또는 폐양성 폐질환을 동반한 항혈액 화확요법제와 병용투여)
 - 14. 혈관 질환 : 루피티스성 혈관염) 용혈성 빈혈, 심인 및 폐양성 증후군 만성질환의 혈소판감소성 자반증, 적지구립소증
 - 15. 중독 질환
 - 다음 질환의 고지식 관련 : 알코올의 해독 및 림프소
 - 16. 부종성 질환 : 홍반성 루피티스 및 만성 신장병에 있어서 배뇨증과 유도 및 단뇨성의 완화
 - 17. 신장성 질환 : 다발성 신장병의 급성화
 - 18. 기타 : 결핵성 수막염(수막염의 치안상 또는 치안 이외의 경우는 주로 적절한 항혈액 화확요법제와 병용투여)

【용법·용량】

프레드니솔론으로서 보통 성인 1일 5-60mg을 1-4회 분할 경구투여합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에게는 투여하지 마십시오.
- ① 유허된 항균제에 있는 감염증, 전신 진균 감염증 환자(만약에)농약작용에 의해 감염증을 악화시킬 수 있습니다.)
 - ② 약의 독성에 약 성분에 과민증 및 병역이 있는 환자
 - ③ 임신산전, 태산전, 수유 환자
 - ④ 혈액성 환자 환자
 - ⑤ 약의 작용을 방해하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당 흡수 장애 증후군(glucose/galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자는 투여하지 마십시오.
2. 다음 환자에게는 신중히 투여하십시오.
- ① 투여하지 않는 것을 원칙으로 하지만 다음 환자에게는 특히 필요한 경우에 한하여 신중히 투여함이다.
 - ③ 신장질환 환자(신기능이 손상되어 내약성이 약해질 수 있음이다.)
 - ④ 혈액성 환자(신기능 장애 환자(만약에)농약작용에 의해 감염증을 악화시킬 수 있습니다.)
 - ⑤ 투약에 약제에 있는 환제수용액의 용액의 양을 조절할 수 있음이다.
 - ⑥ 고혈압 환자, 전신성 약상 환자(전신성 약상에서 의해 감염증을 악화시킬 수 있음이다.)
 - ⑦ 신장질환 환자(혈액속 고축산작용에 의해 감염증이 악화될 수 있음이다.)
 - ⑧ 위장 장애(정맥투입을 받은 환자(정맥치유 지연이 일어날 수 있음이다.)
 - ⑨ 급성 신장기능을 받은 환자(신기능을 일으킨다 보고가 있음이다.)
 - ⑩ 초음성 폐쇄(신장배뇨관 폐쇄를 일으킬 수 있음이다, 초음파 수검을 시행해도 증상이 악화될 수 있음이다.)
 - ⑪ 신장질환 환자(신기능장애와 신장기능장애를 일으킬 수 있음이다, 초음파 수검을 시행해도 증상이 악화될 수 있음이다.)
 - ⑫ 중금속 중독 환자(중금속 중독을 일으킬 수 있음이다, 고금속 중독을 일으킬 수 있음이다.)
 - ⑬ 감염증 환자(만약에)농약작용에 의해 감염증을 악화시킬 수 있음이다.
 - ⑭ 당뇨병 환자(당성당도증에 의해 혈당치가 상승하여 당뇨병이 악화될 수 있음이다.)
 - ⑮ 신부전, 유허성 신부전 환자(배설이 지연되어 부작용이 나타나기 있음이다.)
 - ⑯ 골다공증 환자
 - ⑰ 감작성 저하를 환자(코르티코이드의 활동 반감기가 연장되어 보고가 있음이다.)
 - ⑱ 간경변 환자(간 기능 약화성 환자(만약에)농약작용에 의해 감염증을 악화시킬 수 있음이다.)
 - ⑲ 지질 대사 장애 환자(지질 대사 장애가 악화될 수 있음이다.)
 - ⑳ 지방성증 환자(콜레스테롤이 과다하여 지질 지방성증에 나타날 수 있음이다 보고가 있음이다.)
 - ㉑ 중금속 중독 환자(신장기능에 의해 신장기능이 약해질 수 있음이다.)

12) 간질 환

13) 골다공증, 고혈압, 울혈성 심부전, 심각한 감정의상, 당뇨병, 결핵, 녹내장, 간장염, 신부전, 간질, 소화성 궤
 있습니다.)

3. 부작용

다음 증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 적절한 처치를 합니다.

- 3) 감귤류: 감귤류의 유방, 유방근의 약화나 위축이 수반된다.
- 4) 내장기관: 소화기관, 호흡기관, 순환기관, 소화설상선기장부전, 눈노역, 경경이성, 구상뇌종(교상선), 소뇌의 상경이성, 내담경소, buffalo hump 등이 나타날 수 있다.
- 5) 소화기관: 소화경전, 식욕부진, 구역, 구토, 위통, 가슴불편, 복부팽만감, 구갈, 식욕부진, 소화장애 등이 나타날 수 있다.
- 6) 정신-신경계: 정신장애, 우울증, 다발성 관절염, 불면, 두통, 이치질염, 경련, 경련 통지 후에 나타나는 유두부종증 수반된 뇌막염증(가죽종) 등이 나타날 수 있다.
- 7) 내분비계: 갑상선기능저하, 타액샘 및 상악골의 위축성 장애, 근병증, 척추관협착증, 근골격계의 손상, 장골의 병리적 골절, 근골통, 관절통, 관절염, 관절탈구, 종골성 질환, 종골염, 종골가라지 등이 나타날 수 있다.
- 8) 피부: 단열제, 종출성 질환, 종창 가라지 등이 나타날 수 있다.

- [illegible]

5. 상호작용

- [illegible]

8. 고령자에 대한 투여

- 고령자에 정기투여한 경우, 감임증의 유발, 당뇨병, 골다공증, 고혈압, 후낭하 백내장, 녹내장 등의 부작용이 나타나기 쉬우므로 충분히 관찰하여 신중히 투여합니다.
9. 자장상의 주의사항
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

【저장방법】 기밀용기

【사용기현】외부포장에 표기

【포장단위】 1,000정

- ※ 이 제품은 정부의 “소비자분쟁해결 기준”에 의거 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
- ※ 이 첨부서류의 개정일출발 이후 변경내용은 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 이 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.



제조판매자

유현양행

홈페이지 : www.yuhan.co.kr
 소비자상담실 : 080-024-1188
 (수신자 요금부담)