



**용법·용량** : 1. 긴장성 두통: 성인 1회 1-2캡슐을 1일 3회까지 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다. 2. 편두통: 성인 1회 2캡슐을 복용하고 이후 증상이 개선될 때까지 매시간 1캡슐씩 복용한다. 12시간 동안 5캡슐을 초과하지 않도록 한다.

**사용상의 주의사항**

1. 결코 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것 1)복내장 환자 2)심한 신장에(신장장애) 환자 3)고혈압 환자 4)가장심 심장에 환자 5)간장애 환자 6)MAO 저해제/제제를 투여 받고 있는 환자 3. 다음 사람은 복용하지 말 것 1)지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면 발진, 발적, 충혈되어 붉어짐, 가려움, 부종, 두드러기, 눈꺼풀, 입술 등을 일으킨 적이 있는 사람 2)지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람 4. 다음 환자는 신중히 투여할 것 1)말초혈관장애 환자 2)최근 심혈관성 발작을 일으킨 환자 5. 부작용 : 일시적인 현기, 피부발진 등의 과민증이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 감령줄임함이 바람직하다. 6. 복용 시 주의사항 1)이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것 ①이 약의 복용후 곧바로 두드러기, 부종(부기), 후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴 답답함

등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우 ②고열을 수반하며 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우 ③천식이 나타난 경우 2)바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다. (작성연월일: 08.04.01)

- \* 의약품은 사용하기 전에 반드시 내용을 주의 깊게 읽어야 하며, 의약품과 함께 보관하십시오
- \* 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오
- \* 본 의약품은 우수약품 제조관리기준(KGMP)적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 갖는 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- \* 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 사항은 이시드레(<http://ezdrug.kida.go.kr>) 의약품정보를 참조하십시오



8 806472 000119

**원료약품 및 분량** : 1캡슐(600mg) 중

|               |       |
|---------------|-------|
| 아세트아미노펜(약전)   | 325mg |
| 디클로페나존(USP)   | 100mg |
| 이소메페탄게이트(USP) | 65mg  |

**분류번호** : 114

**성상** : 흰색의 가루가 충전된 상부 적색, 하부 적색의 경질 캡슐이다  
**효능·효과** : 긴장성 두통 및 혈관성 두통(편두통)  
**저장방법** : 밀폐용기

KGMP적격업체 제품  
일반의약품



통근당

제약회사 Kyongbo Pharm

효과빠른 두통약

네가펜 (캡슐)



10캡슐