

씨씨콤

연질캡슐

일반 의약품
분류번호:399
KGMP적격업체

[원료약품 및 분량] 1캡슐(약1,439.1mg)중

L-시스틴(EP)	250mg
주석산수소콜린(USP)	250mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP)	0.13mg
캡슐기제(동물유래) : 젤라틴(소, 가축)	
첨가제(타르색소) : 황색5호, 적색3호, 청색1호, 황색4호	

[성 상] 유백색의 내용물을 함유한 상부 주황색, 하부 황녹색의 연질캡슐제

[효능·효과] 간기능 저하로 인한 소화불량의 보조치료

[용법·용량]

성인 : 1일 1~2캡슐을 식전 또는 소화불량 시 복용하며 1일 4캡슐을 초과하지 않는다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 중증(심한 증상)의 간세포기능부전이나 담도(쓸개길) 폐색(닫혀서 막힘) 환자
 - 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
 - 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
 - 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
시스틴뇨증 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상담 시 가능한 한 이 문서를 소지할 것.
소화기계 : 설사와 복통(배아픔)이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의

지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈당지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 지킬 것.
 - 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오용(잘못사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법 및 사용(유효)기한] 기밀용기, 제조일로부터 36개월

[제조의뢰자] (주)한국코러스제약 / 충북 제천시 강저로 30

[제조사] 구주제약(주) / 경기도 화성시 정남면 덕절제길 5

[판매자] (주)맥스팜 / 경기도 화성시 영통로27번길 14-12

- * 의약품을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- * 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
만약 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품일 경우에는 구입처 및 본사에서 교환해드립니다.
- * 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 사항은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)→정보마당→의약품등 정보를 참조하여 주십시오.