

참시티콜린TM

(시티콜린)

전문약약품

분류번호 219

【원료약품 및 그 분량】 1앰플(2mL) 중

주성분: 시티콜린(KP) 500mg

pH조절제: 수산화나트륨

용제: 주사용수

【성 상】 무색투명한 내용물이 든 무색의 앰플제

【효능·효과】

1. 두부 외상 및 뇌수술에 의한 의식장애
2. 뇌졸중 편마비 환자의 상지기능 회복촉진. 다만, 발작 후 1년 이내에 재발 및 내복약물요법(뇌대사 부활제, 뇌순환개선제 등의 투여)을 실시하는 경우에 있어 하지의 마비가 비교적 약한 경우
3. 다음 질환에 대한 단백분해효소저해제와의 병용요법
 - 1) 급성체장염
 - 2) 만성재발성체장염의 급성악화기
 - 3) 수술후 급성체장염

【용법·용량】

1. 두부 외상 및 뇌수술에 의한 의식장애 : 성인 시티콜린으로서 1회 100~500mg 1일 1~2회 근육 또는 정맥 정맥주사한다.
2. 뇌졸중 후의 편마비 : 이 약으로서 1일 1회 1,000mg 을 4주간 연일 정맥주사한다. 또는 1일 1회 250mg 을 4주간 정맥주사한다. 개선 경향이 인정되면 계속 4주간 더 주사한다.
3. 체장염 : 단백분해효소저해제와 병용하여 이 약으로써 1일 1회 1,000mg 을 2주간 정맥주사한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고 - 앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용 시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단하여 사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용 시에는 각별히 주의한다.
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것. - 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. - 1) 약물 과민반응의 병력이 있는 환자 2) 급성 중증 진행성 두부외상 및 뇌수술에 따른 의식장애 환자 : 지혈제, 뇌압력 하강제 및 저체온증에 대한 준비 후 투여한다. 3) 뇌경색 급성기 의식장애 환자 : 뇌졸중 발작 후 2주 이내에 투여를 시작하는 것이 바람직하다.
4. 이상반응 - 1) 쇼크 : 드물게 쇼크가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 혈압강하, 흉부압박감, 호흡곤란 등이 나타날 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 2) 과민반응 : 때때로 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다. 3) 정신신경계 : 때때로 불면, 드물게 두통, 어지럼, 흥분, 경련 등이 나타날 수 있다. 또한 뇌졸중 후의 편마비에 사용할 경우에는 때때로 마비된 부위의 마비감이 나타나거나 증가될 수 있다. 4) 소화기계 : 때때로 구역, 드물게 식욕부진 등이 나타날 수 있다. 5) 간장 : 때때로 간기능검사전치의 이상이 나타날 수 있다. 6) 눈 : 일과성 복시 7) 기타 : 때때로 열감, 드물게 일시적인 혈압변동, 권태감 등이 나타날 수 있다.
5. 일반적 주의 - 급성 중증 또는 진행성 두부외상 및 뇌수술에 의한 의식장애 환자에게 투여할 경우에는 지혈제, 혈압강하제 및 저체온 등의 처치도 함께 한다.
6. 상호작용 - 레보도파와 병용투여시 레보도파의 효과를 증가시킬 수 있다.
7. 임부에 대한 투여 - 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
8. 소아에 대한 투여 - 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다.
9. 고령자에 대한 투여 - 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.
10. 적응상의 주의 - 1) 근육주사할 경우에는 조직신경 등에 영향을 피하여 다음 사항에 주의하여 투여한다. (1) 근육주사는 부득이한 경우에 하며, 최소 필요량을 투여한다. 또한 산생아, 미숙아, 유아, 소아에는 특히 주의한다. (2) 신경주행 부위를 피하여 주사한다. (3) 주사침을 넣었을 때 격렬한 통증을 호소하거나 혈액의 역류가 발견되면 즉시 침을 빼서 부위를 바꾸어 주사한다. 2) 정맥주사할 경우에는 가능한한 천천히 투여하는 것이 바람직하다.

【저장방법】 밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 2mL × 50앰플

【제조사】 유니메드제약(주) - 충남 아산시 실목로 110-27

첨부문서 작성년월일 : 2016. 10. 31

※ 이 약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 약국·병의원 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

※ 본 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 아래의 유니메드제약 홈페이지 또는 고객센터를 통해 확인하실 수 있습니다.

홈페이지 (www.unimed.co.kr) ☎ 고객센터 : 080-500-5100

UNIMED 유니메드제약

서울특별시 송파구 삼전로 69 (잠실동) 유니메드빌딩

UN07018