

살진균(곰팡이)제 무좀치료제

애니존TM 크림 15g

(테르비나핀염산염)

일반의약품 **KGMP**
분류번호 265 적격업체제품

Anyzone[®] Cream (Terbinafine HCl)

■ 원료약품의 분량 : 1g 중

유효성분 : 테르비나핀염산염(USP)10mg (테르비나핀으로서 8,888mg)
첨가제 : 미리스틴산이소프로필, 벤질알코올, 세탄올, 세틸팔미테이트, 소르비탄스테아레이트, 수산화나트륨, 스테아릴알코올, 정제수, 폴리소르베이트60

■ 성 상 : 백색의 크림제

■ 효능 · 효과

1. Trichophyton(T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis 및 Epidermophyton floccosum과 같은 피부사상균에 의한 피부진균감염증 : 족부백선, 고부백선(완선), 체부백선
2. Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur)에 의한 어루러기
3. 피부칸디다증

■ 용법 · 용량

- 1일 1 ~ 2회 환부(질환부위)에 바른다.
질환에 따른 치료기간은 다음과 같다.
1. 족부백선 : 1일 1회, 1주
시간형(발가락사이) 족부백선 : 1일 2회 1주
족자형(발바닥) 족부백선 : 1일 2회, 2주
 2. 체부백선, 고부백선 : 1 ~ 2주
 3. 피부칸디다증 : 1 ~ 2주
 4. 어루러기 : 2주
치료기간 이후에도 임상적인 증상이 개선되지 않으면 진단을 다시 해야 한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.
 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자
 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
 3) 소아
2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
 1) 발진을 동반한 과민반응이 나타나는 경우
 2) 고도한 자극이 나타나거나 더 심해지는 경우
 3) 피부의 두드러기, 발진, 홍반, 가려움, 자극감, 국소의 접촉피부염, 피부발진, 상처의 딱지, 색소침착이상, 자통(刺痛), 작열감이 적용부위에 나타나는 경우
3. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항
 1) 의사의 지시가 없는 한 밀봉봉대법 또는 포장법을 사용하지 말 것.
 2) 이 약에 대한 반응이 나타나지 않으면 진균학적인 검사를 실시하여 다른 병원균에 의한 감염 여부 확인 후 다른 항진균요법을 시행할 것.
 3) 산성에서 칸디다균의 증식이 잘 되므로 칸디다증일 경우에는 산성 비누를 사용하지 말 것.

- 4) 손상되지 않은 피부에 있어서 이 약의 재흡수율이 낮아서 전신적 효과가 나타날 가능성은 희박하나 상처부위, 넓은 부위, 영아(표면적/체중의 비율 및 배내옷의 밀봉 효과)의 경우에는 전신적 효과가 나타날 수 있으므로 주의할 것.
- 5) 실수로 이 약을 복용한 경우에는 1차로 활성탄으로 주성분을 제거하고 필요시 대증요법을 실시할 것.
- 6) 이 약은 외용으로만 적용할 것.
- 7) 안과용으로 각막, 결막에 사용하지 말 것. 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 이 약이 눈을 자극할 수 있으며, 드물게 잠재성 진균 감염이 악화될 수 있다. 충분한 양의 물로 완전히 씻어 낼 것.
- 8) 손톱, 두피, 입주위 및 질부위에 사용하지 말 것.
- 9) 모르모트를 대상으로 한 동물실험에서 약한 광독성이 나타났다는 보고가 있다.
4. 저장상의 주의사항
 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 15g

※ 주의

1. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용하지 마십시오.
 2. 유효기한 또는 사용유효기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
 3. 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
 4. 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
 5. 사용중 중간에 공기가 찬 부분이 나올 수 있으나 중량에는 문제가 없습니다.
- ※ 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질 · 변패, 오염되었거나 손상된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.
- ※ 본 첨부문서 문안 개정일자(2017년 09월 06일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)또는 소비자 상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 제품의 사용기한은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다.

09017
ANO-03-17-1171

제조판매원
SAMJIN **삼진제약주식회사**

본 사 : 서울특별시 마포구 위문산로 121 (서교동)

공 장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52

☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031) 353-1712/6