

에르빈주사액

메틸에르고메트린말레산염

전문약품

에르빈은 자궁수축 및 지혈의 목적으로 사용되는 에르고메트린의 메틸유도체로서 자궁평활근을 직접선택적으로 수축하고, 분만후의 출혈량을 감소시키는 등 작용발현이 빠르고 지속적인 자궁수축력을 갖는 우수한 제제입니다.

[성분·함량] 이 약 1mL 중
• 유효성분 : 메틸에르고메트린말레산염(KP) 0.2 mg
• 첨가제(안정제) : 타르타르산 0.25 mg
• 기타 첨가제 : 염화나트륨, 주사용수

[성상] 갈색 액체에 들어있는 무색투명한 주사액

[효능·효과]
다음의 경우 출혈의 방지 및 치료: 태빈간출 후, 분만 후, 제왕절개술 후, 유산 후 출혈, 자궁퇴축부전

[용법·용량]
성인 : 보통 메틸에르고메트린말레산염으로서 1회 0.1-0.2 mg를 정맥주사 또는 1회 0.2 mg를 파하 또는 근육주사합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고
염류주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의하십시오.
2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
1) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
2) 분만 중인 여성
3) 자간(eclampsia) 환자
4) 분만 유도 환자
5) 이두빈출전(자궁수축작용으로 인한 자궁파열, 태아사망 등이 나타날 수 있으므로 분만유도 또는 촉진제로 이용해서는 안됩니다.)
6) 고혈압, 임신중독증 환자(혈관수축작용에 의해 증상이 악화될 수 있습니다.)
7) 이 약 또는 맥각 알칼로이드에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
8) 중증 허혈성 심질환 및 그 병력이 있는 환자(관동맥의 경색에 의한 협심증, 심근경색이 나타날 수 있습니다.)
9) 폐색성 혈관질환 또는 그 병력이 있는 환자
10) 중증 전염 상태에 있는 환자
11) 패혈증 환자(혈관수축작용에 의한 감수성이 증가할 수 있습니다.)
3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
1) 심질환 환자(혈관수축작용으로 증상이 악화될 수 있습니다.)
2) 간 또는 신질환 환자(대사 및 배설지연이 나타날 수 있습니다.)
4. 부작용
1) 소화기계 : 구역, 구토, 복통, 설사 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
2) 순환기계 : 혈압상승, 혈압저하, 흉통, 흉부압박감, 빈맥, 서맥, 심계항진, 말초혈관경련 등이 나타날 수 있습니다. 드물게 심근경색, 협심증, 관동맥경축, 방실차단 등의 증상이 나타날 경우에는 투여를 중단하고 적절한 처치를 합니다.
3) 정신신경계 : 두통, 졸음, 어지러움, 구갈, 이명, 흥분, 경련, 드물게 일시적인 대뇌혈관 발작과 같은 혈압상승으로 인한 신경 합병증, 한각 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
4) 과민증 : 드물게 발진, 아나필락시스 반응 등이 나타날 경우에는 투여를 중지합니다.
5) 기타 : 태빈간출(태전), 발한, 자궁수축에 의한 복통 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
6) 속 : 드물게 속이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 혈압저하, 구역, 구토, 청색증, 호흡곤란, 허탈 등의 이상 증상이 확인될 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
5. 일반적주의
온전 또는 기계조작에 대해서는 알려진 바 없으나 치료 초기에 특히 주의해야 합니다.
6. 상호작용
1) 프로모르핀, 카베르골린과 병용투여시 혈관수축 및 고혈압이 나타날 수 있습니다. 따라서 산욕기에 이 약과 브

- 로모르핀과의 병용은 피합니다.
- 2) 교감신경흥양제(예 : 국소마취제) 또는 에르고타민과 병용투여시 혈관수축작용이 증가할 수 있습니다.
- 3) 옥시토신, 프로스타글란딘 등 자궁자극물질에 의해 이 약의 효능이 증가되어 옥시토신과 병용투여시 경련 및 뇌수증을 동반하는 고혈압이 나타날 수 있습니다.
- 4) 마크로라이드계 항생물질, 테트라사이클린과 병용투여에 의해 혈관수축작용이 증가할 수 있습니다.
- 5) 베타수용체차단제와 병용투여에 의해 말초 혈액공급장애의 위험성이 증가할 수 있습니다.
- 6) 할로란, 마취사들루란과 같은 마취제는 이 약의 자궁수축 효과를 감소시킬 수 있습니다.
7. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 자궁수축작용으로 인한 자궁내 태아의 사망, 유산 등이 나타날 수 있으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않습니다.
2) 이 약은 모유로 이행한다는 보고가 있으므로 옥시토신, 프로스타글란딘 또는 그 유도체가 효과가 없거나 급기인 경우에만 수유부에 투여합니다.
3) 이 약을 수일간 투여한 수유부의 영아에서 동맥혈압상승, 서맥, 빈맥, 구토, 설사, 불안 또는 간대성근경련증 등의 중독 사례가 관찰되었으며 모유분비를 억제한다는 보고가 있습니다.
8. 과량투여시의 처치
1) 증상 : 구역, 구토, 불안감을 동반하는 급성 위염, 오한, 창백, 어지러움, 고혈압 또는 저혈압, 말초혈관수축, 사지의 마비, 자통, 통증, 호흡가능지하, 경련, 혼수
2) 처치 : 경구투여한 경우에는 위세척에 의해 약물을 제거한 후 약용탄을 투여합니다. 증상의 치료는 심혈관 및 호흡기능을 엄격히 감독하면서 실시하며 안정이 필요하다면 벤조다이제핀을 사용할 수 있습니다. 중증의 동맥경련 이 나타나면 니트로프루시드나트륨, 펜롤아민, 디하이드랄린 등 혈관확장제를 투여합니다. 관상동맥 수축시 즉시 질산염류 등의 협심증치료제를 투여합니다.
9. 적응상의 주의
1) 60초 이상 혈압을 주의깊게 관찰하면서 정맥주사시 천천히 주사합니다.
2) 근육주사시 조직, 신경에 대한 영향을 피하면서 다음 사항에 주의합니다.
① 신경 주행부위를 피하고, 주사침을 삽입할 때 신경을 건드리는 듯한 통증을 호소할 경우에는 즉시 부위를 바꾸어 주사합니다.
② 반복 주사할 경우에는 좌우로 바꾸어서 주사하거나, 주사부위를 변경하면서 주사합니다.
3) 동맥주사나 동맥주위 주사는 피합니다.

[저장방법] 차광밀봉용기, 냉정(2-8℃)보관

[사용기한] 외부포장 참조

[포장단위] 1mL/앰플 X 50

※ 본 약품들은 KGMP(약품제조 및 품질관리(중)자격업체에서 생산하여 일정한 품질 관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 유효기한 또는 시용기한이 경과 되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입한 약국 등 판매업소에 한하여 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 약은 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.daewonpharm.com) 나 전화(080-497-8272)에서 확인하실 수 있습니다. ※ 약품을 용어설명 및 기타 자세한 약품정보는 약약품통합정보시스템(<https://hedrug.mfds.go.kr>)의약품 정보를 참조하세요. ※ 부작용 피해구제 신청 한국약물관리안전관리원 (1644-6223) • 작성일자 : 2021. 01. 25.

【제조(제사)】

Daewon 대원제약

본사 : 서울특별시 성동구 천호대로 386
공장 : 경기도 화성시 향남읍 제왕안단1길 24

【제조지】

(주)휴메딕스

충청북도 제천시 바이오밸리2로 17