

원스틴TM

연질캡슐

KGMP
적격인증제품

일반의약품
분류번호 315

(산화마그네슘+토코페롤아세테이트)

원스틴[®]연질캡슐은 근육과 신경에 대한 보호작용과 혈액순환 개선작용을 나타내는 항스트레스물질인 산화마그네슘과 세포노화를 방지하고 혈액순환을 개선하는 항산화비타민인 토코페롤아세테이트(비타민E)가 복합처방된 제품으로서 근육경련과 말초혈행장애, 갱년기증상을 효과적으로 개선합니다.

■ 원료약품의 분량

1캡슐 중	
토코페롤아세테이트(KP)	500mg
산화마그네슘(KP)	250mg
	(마그네슘으로서 150.8mg)

■ 성상 : 미황색의 점조성 내용물이 든 적갈색의 장방형 연질캡슐제

■ 효능·효과

- 다음 경우에 비타민E의 보급 : 노년기
- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림, 수족냉증(손발이 차가움)
- 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

■ 용법·용량 : 18세 이상의 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐을 복용

■ 사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 3) 심한 증상의 신부전 환자
 - 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 4) 신장장애 환자
 - 5) 저단백혈증 환자
 - 6) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

 - 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 반점, 설사, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
 - 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.

- 4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 올혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 5) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
- 6) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
 - 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것
 - 3) 지방과부하(스트레스)로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정중중 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 60, 120캡슐

■ 제조원 : 삼진제약(주)-경기도 화성시 향남읍 상신리 904-2(제조의뢰자)
(주)서흥캡셀-경기도 부천시 소사구 송내동 317번지(제조사)

※ 주의

1. 의약품을 사용하기전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
2. 허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용하지 마십시오.
3. PTP포장을 개봉하여 복용시 가림 캡슐제에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용시 캡슐제에 포장물이 있는지 꼭 확인하고 복용하십시오.
4. 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.

※ 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변해·오염되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2012. 1. 29) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)나 소비자 상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)을 통해 알 수 있습니다.

연질캡슐은 제형이 특수하므로 보관상태(온도 30℃ 이상, 상대습도 75% 이상)에 따라 젤라틴 껍질이 변형될 수 있습니다. 적사일광을 피하고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하시고, 특히 제품 개봉후에는 인습에 주의하여 보관하십시오.

01012

WIC-03-10-1171

판매원

SAMJIN 삼진제약주식회사

본사 : 서울특별시 마포구 서교동 338-8

파막 : 경기도 화성시 향남읍 상신리 904-2

☎ : 본사(02)3140-0700, 공평(031)353-1712/6