

유·그린 크림


20%Urea Cream

유그린크림은 고농도의 urea를 함유하여 거친손, 건피증, 팔꿈치·무릎·발뒤꿈치의 각피증 등 거친피부나 비석거리는 피부, 딱딱하게 된 피부에 부족한 수분을 보충하여 피부를 매끈하게 하는 치료크림입니다.

본 약은 사용하기 전에 본 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 본 첨부문서를 본 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

■ 약리작용 및 특징

1. 요소(urea)가 피부각질층에 작용하여 수분(水分)보(保)특(特)능력을 높여주어 건조한 피부를 매끄럽게 합니다.
2. 요소(urea)의 각질용해박리작용에 의해 비후되어 있는 각질층을 용해하여 얇게하고 각질층의 표면을 부드럽게 개선시킵니다.
3. 착색제, 향료를 사용하지 않기 때문에 피부에 부드러운 치료크림입니다.



■ 원료약품 및 그 분량 : 1g 중

주성분 : 우레아(KP) 200mg
보존제 : 파라옥시벤조산프로필(KP) 1mg
보존제 : 파라옥시벤조산메틸(KP) 1mg

그 외 스쿠알란, 토코페롤아세테이트, 글리시리진산암모늄, 폴리소르베이트 60, 세레신, 세틸팔미테이트, 세틸황산나트륨, 글리세릴스테아레이트 / 피이지-100스테아레이트, 세틸알코올, 백색바셀린, 경질유동파라핀, 디메티콘, 수산화나트륨, 부틸렌글리콜, 에데트산나트륨수화물, 효모엑스, 에칠아스코빌에텔, 판테놀, 피리독신염산염 및 정제수 함유

■ 성상 : 백색의 크림

■ 효능·효과

진행성 지장각피증(주부습진의 건조형)
손·발바닥 각피증, 어린선(魚鱗鱗), 노인성 건피증(피부건조증), 모공성 태선, 아토피피부

이런 증상일 때

- 설겅이등으로 손가락이 **까칠까칠**할 때
 - 어린이나 노인의 피부가 건조하여 **비석비석**할 때
 - 팔꿈치, 무릎, 발뒤꿈치, 복숭아뼈가 **딱딱**할 때
- ※ 설겅이후, 세탁후, 목욕후, 취침전에 바르면 보다 효과적입니다.

■ 용법·용량

1일 1~수회 환부(질환부위)를 씻은 다음 이 약을 바른후 충분히 문지른다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자(부위 또는 경우)에는 투여하지 말 것.
 - 1) 안점막등의 점막
 - 2) 이 약 성분에 과민증 환자
 - 3) 급성 습진 또는 염증성 피부질환 환자
 - 4) 신부전 환자에 광범위하게 적용하는 경우
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 염증, 균열(갈라짐)을 수반한 환자(일시적인 자극 증상이 나타날 수 있다)
 - 2) 피부자극에 대한 감수성이 높아진 환자(일시적인 자극 증상이 나타날 수 있다)
3. 부작용
 - 1) 자극증상 : 통증, 열감 때때로 홍조, 가려움 등의 자극증상이 일시적으로 나타나거나 투여초기에 나타날 수 있다.
 - 2) 과민증 : 과민증상이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
 - 3) 피부 : 때때로 습진화, 피부의 균열(갈라짐), 구진, 따끔따끔한 느낌, 작열감, 인설, 드물게 부종, 건조화가 나타날 수 있으며 이러한 증상이 심하게 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
4. 상호작용

이 약에 의해 코르티코이드, 디트리놀, 5-플루오로우라실과 같은 성분의 피부로의 흡수 및 침투력이 높아질 수 있다.
5. 적용상의 주의
 - 1) 이 약은 외용으로만 적용한다.
 - 2) 궤양, 미란(긁힘), 상처 부위에는 직접 적용하지 않는다.
 - 3) 눈, 코, 입 및 다른 점막에 닿지 않도록 주의하여 적용한다. 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 충분한 양의 물로 완전히 씻어 낸다.
6. 저장상의 주의사항

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

■ 포장단위 : 50g

■ 사용기간 : 제조일로부터 36개월

■ 저장방법 : 밀폐용기에 보관

첨부문서 최초 작성년월일 1992.07.10
첨부문서 최종 개정년월일 2014.09.16

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시 "품목별 소비자 분쟁 해결기준"에 의거 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 동성제약 홈페이지(www.dongsung-pharm.co.kr) 및 식품의약품안전처 홈페이지 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 해당 제품정보란에서 확인할 수 있습니다.

DS-1409-02

제조 및 판매원
동성제약주식회사
공정 : 충남 아산시 둔포면 관대안길 45
본사 : 서울시 도봉구 도봉로 683(방학동)

www.dongsung-pharm.co.kr / 소비자상담전화 : 080-001-0921