

치매성 뇌기능 장애, 말초순환 장애에

징카신정 80mg

(은행염엑스)



일반의약품

의약품 분류번호	219 기타의 순환계용약
-------------	---------------------

【성분·함량】 1정 중

은행염엑스(KHP).....80mg
첨가제(타르색소):황색4호 알루미늄레이크(KPTaCS)
첨가제(타르색소):청색1호 알루미늄레이크(KPTaCS)
첨가제(동물유래):유당수화물(소·우유)

【성상】 녹색의 타원형 필름코팅 정제

【약리작용 및 특징점】

1. 혈관벽 손상방지
징카신정은 혈관세포를 파괴하여 혈관 경화를 유발하는 free radical 생성을 억제하여 혈관을 보호하고 탄력을 유지해 줍니다.
2. 혈액의 점도 저하
징카신정은 혈액의 점도를 저하하여 혈액의 흐름을 방해하는 혈소판 응집을 억제하므로 혈액순환을 원활하게 합니다.
3. 말초 혈관 확장작용
징카신정은 혈관 확장인자들의 유리를 촉진하므로 혈류공급이 부족한 조직의 혈류 공급량을 증가시켜 줍니다.

【효능·효과】

1. 주 효능효과
1) 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증(이따금 절뚝거림))의 치료
2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
3) 이명(귀울림), 두통, 기억력 감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능 장애의 치료

【용법·용량】

▶ 성인

- 1) 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명(귀울림) : 은행염엑스로서 1회 40mg, 1일 3회 또는 1회 80mg, 1일 2회 경구 투여합니다.(복용합니다.)
- 2) 기질성 뇌기능 장애 : 은행염엑스로서 1회 40~80mg, 1일 3회 또는 1회 120mg, 1일 2회 경구 투여합니다.(복용합니다.)
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약에 과민증 환자
2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(못견딤증)(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍(부족)증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 부작용
1) 드물게 가벼운 위장관(위창자) 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
2) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
· 어지러움
· 가려움증
4. 일반적 주의
이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.
5. 임부에 대한 투여
동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신 중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.
6. 소아에 대한 투여
소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.
7. 저장상의 주의사항
직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

【저장방법 및 사용기간】

저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1~30℃) 사용기간 : 제조일로부터 36개월

【포장 단위】 100정, 1000정(조제용)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리하에서 제조된 (KGMP) 적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 유통 과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 주의

1. 사용전에 제품설명서를 자세히 읽어보십시오.
2. 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상의하십시오.
3. 정해진 용법·용량을 준수하십시오.
4. 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

■ 소비자상담전화 (서울)02-3477-1731 (부산)051-204-3831



대우제약(주)

서울특별시 서초구 남부순환로 2435 원림빌딩 (서초동)
부산광역시 사하구 대대로 153(신평동)

최종개정년월일 : 2015. 05. 27
작성년월일 : 2015. 04. 30

※ 이 첨부문서 작성일자(2015년 4월 30일)이후 변경된 내용은 <http://www.daewoopharm.com>나 051-204-3831(대우제약 개발부)에서 확인할 수 있습니다.