

드리클로액(염화알루미늄)

일반의약품

▶원료약품 및 분량

액 100g 중 알루미늄클로로하이드레이트(EP) 20.0g
(무수물로서는 11.0g)

▶성 상 에탄올 냄새가 나는 무색(아주 연한 녹색), 투명한 액

▶효능효과 거드랑이, 손, 발의 다한증(땀과다증)

▶용법용량

저녁에 적용 부위에 적당량을 바른 후 다음날 아침 물로 씻어 제거한다.

발한(땀이 남)이 멈출 때까지는 매일 밤 한번씩 사용하고 증상이 호전(나아짐)될 경우에는 일주일에 1~2회로 줄인다.

▶사용상 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 : 이 약 성분에 과민증인 환자
2. 다음 부위에는 적용하지 말 것 : 본 제는 벗겨지거나 손상된 피부, 또는 최근에 면도한 부위에는 적용하지 말 것
3. 일반적 주의
 - 1) 치료 대상 부위에만 사용하여야 하며 적용부위는 완전히 건조한 상태를 유지시켜야 한다.
 - 2) 눈이나 점막에 닿지 않도록 주의한다.
 - 3) 드리클로 사용 후 땀분비의 감소가 일시적으로 자극감이나 발적(충혈되어 붉어짐)을 초래할 수 있으며 이러한 증상이 심해지면 사용을 일시 중단하여야 한다.
4. 과다 적용시의 처치 : 과다 적용시 자극감, 발적(충혈되어 붉어짐), 낙설이 일어날 수 있으며 이러한 증상이 나타났을 경우 필요에 따라 습윤제나 1%히드로코르티손 크림을 바른다.
5. 적용상의 주의 : 본 제를 적용하기 바로 직전에 목욕은 피해야 하며 적어도 적용 후 한 시간은 지나야 한다. 거드랑이의 털은 본 제를 적용하기 12시간 전후로는 제거하지 말아야 한다.

▶저장방법 및 사용기간: 기밀용기, 차광용기, 25℃ 이하 서늘한 곳 보관

▶포장단위 20ml

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 한다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 약국·병의원 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

▶제조원

계약제조원 : Stiefel Laboratories(UK) Ltd.

Holtspur Lane Wooburn Green High Wycombe Buckinghamshire HP10 0AU United Kingdom

전공정 위탁제조(수탁제조원) : Stiefel Laboratories(Ireland) Ltd.

Finisklin Industrial Estate Sligo Ireland

수입판매원 : 글락소 스미스클라인, 서울특별시 용산구 한강대로 92

고객센터(수신자 요금부담) : 080-901-4100

최신의 허가사항은 www.gskkorea.co.kr이나 위의 번호에서 확인할 수 있습니다.