

- 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하시기 바랍니다.
- 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

분류번호 : 231(치과구강용약) 일반의약품

바르는 구내염(입안염) 치료제

터치메드® 연고

TOUCH-MED Ointment

터치메드는 점착성이 뛰어난 특수기제를 사용하여 구내염(입안염) 환부(질한 부위)를 보호해 주므로 치료효과가 좋습니다.^{ref)}

【원료약품의 분량】 1g 중

주성분 : 연화세틸피리디늄(USP) 1mg

주성분 : 에녹솔론(EP) 3mg

주성분 : 아줄렌설펜산나트륨(별규) 0.2mg

【성상】 이 약은 옅은 청색 내지 청색의 연고제입니다.

【효능·효과】 구내염(입안염), 설염(혀염)

【용법·용량】 1일 2~4회 환부(질한 부위)에 적량을 바르십시오.

※(마른)면봉 혹은 마른 손을 이용하여 환부(질한 부위)에 적량을 도포하십시오(바르십시오).

【사용상의 주의사항】

1. 다음 사람은 사용전에 의사, 치과의사 또는 약사와 상의하십시오.

- 1) 약물에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 환자
- 2) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 환자

2. 사용할 때에는 다음 사항에 주의하십시오.

- 1) 정해진 용법·용량을 지키십시오.
- 2) 소아에 사용하는 경우 보호자의 지도·감독하에 사용하십시오.
- 3) 구강(입안)용으로만 사용하고 안과용 등 타용으로 사용하지 마십시오.

3. 사용중 또는 사용후에는 다음 사항에 주의하십시오.

- 1) 본제(이 약) 사용으로 증상이 악화되거나 또는 알레르기 증상(예를 들면 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증 등)을 일으키는 경우 사용을 중지하고 의사, 치과의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 2) 수일간 사용여도 증상이 개선되지 않을 경우, 사용을 중지하고 의사, 치과의사 또는 약사와 상의하십시오.

4. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고, 가능한 한 습기가 적고 서늘한 장소에 (밀봉하여(뚜껑을 꼭 닫아)) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질을 보호·유지하기 위해 타용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 터치메드 연고 7g

【문의전화】 본사 : (02) 2021-9300, 소비자 상담실 : 080-023-1897(수신자 요금부담)

【소분제조사】 동화약품(주)

본사 : 서울특별시 중구 후암로 98, 19층, 공장 : 충청북도 충주시 충주산단1로 167

【제조자】 SATO Pharmaceutical Co., Ltd. Hachioji factory

1468 Hazama-cho, Hachioji-shi, Tokyo, Japan

^{ref)} Clinical Effect of SKN-110 for Stomatitis, Kyuichi Kamoi et al, 1990;24:547-552

본 의약품은 KGMP 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 1509 우 공경거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다. 본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 식품의약품 안전처 온라인의약품사전(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조해주시기 바랍니다.

※이 첨부문서 작성일자(2015년 9월 8일) 이후 변경된 내용은 www.dong-wha.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.



동화약품

