

# 안정액 (천왕보심단)

## ■ 원료약품의 분량 : 1병(50ml) 중

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 생지황(생규)                    | 500mg  |
| 인삼(KP)                     | 62.5mg |
| (총 파낙사디올로서 0.27mg 이상)      |        |
| 현삼(KP)                     | 62.5mg |
| 단삼(KP)                     | 62.5mg |
| 원지(KP)                     | 62.5mg |
| 길경(KP)                     | 62.5mg |
| 복령(KP)                     | 62.5mg |
| 오미자(KP)                    | 125mg  |
| (슈잔드린으로서 0.15mg)           |        |
| 당귀(KP)                     | 125mg  |
| 천문동(KP)                    | 125mg  |
| 맥문동(KP)                    | 125mg  |
| 백자인(KP)                    | 125mg  |
| 신조인(KP)                    | 125mg  |
| 황련(KP)                     | 250mg  |
| (베루베린(염화베르베린)으로서 3.5mg 이상) |        |
| 첨가제(보존제) : 벤조산나트륨(KP)      | 30mg   |

## ■ 성상 : 담갈색의 특이한 냄새와 맛이 있는 액체

## ■ 효능 · 효과 : 불면, 불안, 초조, 목마름, 두근거림, 숨참, 신경쇠약, 건망, 번열( 가슴이 답답하고 열이 나는 증상 등)

- 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의 할 것.

- 2) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.

- 3) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

## 5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것 (사용 후 반드시 밀폐 보관 할 것.)

- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

- 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

## ■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

## ■ 포장단위 : 1병(50ml) × 1, 100병

※ 본제(이약)는 생약성분을 배합한 제제이므로 간혹 침전 이 생기는 수가 있으나 약효에는 아무런 변화가 없으니 흔들어 복용하십시오.

※ 사용기한 또는 유효기한이 경과 되었거나 변질 · 변패 · 오염되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환 하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2014년 11월 20일) 이후 변경 된 내용은 홈페이지([www.samjinpharm.co.kr](http://www.samjinpharm.co.kr)) 나 소비자 상담실(수신자부담 전화 080-082-1234) 을 통해 알 수 있습니다.

## ■ 용법 · 용량 : 보통 성인 1병(50ml)을 1일 1회 식간 (식사때와 식사때 사이)에 복용한다.

## ■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

신생아, 수유부, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(이 약에 함유되어 있는 황련에 의해 유 · 조산(조기분만)의 위험이 있다.)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등이 나타날 수 있다.)

- 2) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)

- 3) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의할 것.)

- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

- (1) 피부 : 발진, 두드러기 등

- (2) 소화기계 : 식욕부진, 복통, 위부불쾌감, 구역, 구토, 설사 등

※ 제품 개봉시 또는 취급시 포장재(용기, 케이스)에 의해 상처를 입을 수 있으며, 유리병이 파손될 우려가 있으니 주의하십시오.

## ■ 제조회 : 삼진제약(주)-경기도 화성시 향남읍

제약공단1길 52(제조의뢰자)

익수제약(주)-경기도 광주시 곤지암읍

독고개길86번길 38(제조사)

제품 개봉시 또는 취급시 포장재(용기, 케이스)에 의해 상처를 입을 수 있으며, 유리병이 파손될 우려가 있으니 주의하십시오.



판매원

**삼진제약주식회사**

본 사 : 서울특별시 마포구 외우산로 121 (서교동)

공 장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52

☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031) 353-1712/6