

노이로민®

세인트존스워트80%메탄올건조엑스 정 300mg

NOIROMIN® Tablet 300mg
St. John's Wort 80% Methanol Dried Extract



(01)8806445007204

불안, 무기력, 가법고 일시적인 우울증상

물질문명의 발달과 더불어 현대인들은 과중한 업무, 복잡다단한 사회구조, 급변하는 시대조류 및 각종 공해 등으로 인해 많은 스트레스를 받게되며, 이로인해 긴장감 및 불안감이 연속될 뿐 아니라 원인 모르게 무기력하고 우울한 상태에 빠지게 되는 경우가 많습니니다. 이와같은 상태가 지속되면 정신신경 계통에 균형을 잃게 됨과 동시에 신체이상증상이 나타나 정신 및 육체적 건강을 해할 수 있습니다. 노이로민의 주성분인 St. John's Wort 80% Methanol Dried Extract는 예로부터 유럽에서 뇌신경계질환에 널리 사용 되어온 물레 나물과(Hypericaceae)의 Hypericum Perforatum이라는 식물에서 추출한 순수 생약제이며 이 생약중에는 Hypericin과 Hyperforin이라는 특이한 화합물이 함유되어 그 유효성이 입증되었습니다. **생약분야에 대한 독보적 노하우로 130년 동안 생약기술의 메카로 평가받아온 독일 슈바베사에서 개발 되어 유럽 및 구미각국에서 실시한 임상시험결과 스트레스나 신경성으로 인한 정신적인 불안정(우울, 불안, 초조, 피로, 수면장애, 두통 등의 증상개선에 뛰어나다는 것이 입증되었습니다.**

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정(450mg) 중

- 유효성분: 세인트존스워트80%메탄올건조엑스(별규) 300mg
- 동물유래성분: 유당수화물 (소, 우유)
- 기타 첨가제: 바닐린, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 시메티콘유제, 저지함도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 카르나우바인, 콜로이드성아산화규소, 크로스카르멜로오스나트륨, 말크, 폴리에틸렌글리콜4000, 황색산화철, 히프로멜로오스2910

[성 상] 담황갈색의 원형 필름코팅정

[약리작용 및 특징]

- 1) 노이로민은 세인트존스워트80%메탄올건조엑스를 주성분으로 하는 생약제제로 기존 항우울제에 비해 동등 이상의 효과를 발휘 하면서도 부작용을 최소화한 가장 안전한 항우울제입니다.
- 2) 노이로민은 중추신경내에서 신경전달물질(neurotrans mitter)의 파괴를 막아 뇌에서의 기능을 정상적으로 유지시켜줍니다.
- 3) 노이로민은 스트레스나 신경성으로 인한 정신적인 불안정 (우울, 불안, 초조, 피로, 수면장애, 두통 등)의 증상개선에 매우 효과적입니다.
- 4) 노이로민은 독일 슈바베사의 특수제법(안정화제로서 아스코르빈산을 첨가하여 약리활성 물질인 히퍼포르인(hyperforin)의 농도를 3~6%로 유지)으로 제조되었습니다.

[효능·효과]

- 불안, 무기력 상태의 완화
- 가법고 일시적인 우울증상의 완화

[용법·용량]

성인 및 12세 이상의 소아: 세인트존스워트80%메탄올건조엑스로서 1회 300mg 1일 3회 소량의 물과 함께 씹지 말고 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 또는 이 약의 성분에 과민반응을 나타내는 사람
- 2) 심한 우울증 환자
- 3) 피부 광과민반응 병력이 있는 사람
- 4) 임부 및 임신가능성이 있는 여성 또는 수유부(사용경험이 충분하지 않습니다.)
- 5) 12세 미만의 어린이(사용경험이 충분하지 않습니다.)
- 6) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 항바이라스제 중 항레트로바이러스제 및 만성C형 간염 치료제(에파비렌즈, 네비라핀, 데라비린, 라미부딘, 지도부딘, 스타부딘, 아바카비르, 디다노신, 잘시타빈, 인디나비르, 시퀴나비르, 리토나비르, 펠리나비르, 암프레나비르, 소포스부비르, 레디파스비르 등)와 병용시 이러한 항바이라스약의 치료효과가 떨어지고 내성이 발현될 수 있다.
- 2) 항응고제(아세노쿠마롤, 헤파루린, 헤파로이드, 와르파린, 다비가트란, 리바록사반, 아픽사반 등)의 항응고작용을 저해한다.
- 3) 세포중식 억제제(이리노테칸, 시클로포스파마이드, 타목시펜, 탁솔, 에토포시드 등)
- 4) 면역억제제(시클로스포린, 타크로리무스, 시롤리무스, 에베로리무스 등)와 병용시 혈장농도의 감소 및 면역억제효과의 저하를 야기시키며 잠재적으로 심각한 결과(이식거부)를 초래할 수도 있다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

- 1) 강한 자외선 노출(장시간 일광욕, 태양광램프, 선풍침대)
- 2) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 합니다.
의사의 치료를 받고 있는 사람
- 3) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의합니다.
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 꼭 읽어보십시오.
- 4) 피부: 드물게 알레르기 피부반응(홍반점, 가려움)이 나타나는 경우, 햇볕에 대한 피부의 민감성이 증가하는 광과민반응이 나타나는 경우(특히, 피부가 흰 사람에게서 유발될

가능성이 있습니다.)

- 2) 정신신경계: 드물게 피로, 불안, 졸음, 초조가 나타나는 경우
- 3) 소화기계: 드물게 위장과 장에 나타나는 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의 할 사항

1) 지금까지 이 약에 의한 급성 중독증상은 보고된 바 없습니다. 과용량 복용후 광독성 현상이 나타날 수 있으므로 1~2주일 동안은 태양광선과 자외선으로부터 피부가 보호되어야 합니다(외출시간을 줄이고, 의복 및 햇빛 차단지수가 높은 햇볕보호 제품을 이용하여 햇볕으로부터 피부를 보호 합니다.)

2) 이 약은 CYP-450 대사효소를 유도하므로, 이 효소에 의해 대사되는 다른 의약품의 혈장 농도를 감소시킬 수 있습니다. 반대로 이상반응이 동반될 수 있는 약물을 동시 투여시 이 약의 복용을 갑자기 중단하면 혈장농도가 증가할 수 있습니다. 따라서 다음 의약품과의 병용(함께 복용)은 가능하면 피하고 부득이하게 병용(함께 복용)시에는 이상반응 발현(드러냄) 여부 및 아래 사항에 주의해야 합니다.

(1) 감시약(디기톡신, 디곡신, 메틸디곡신 등), 기관지확장제(아미노필린, 클린테오 필린, 테오필린 등), 항부정맥약(아미요다론, 퀴니딘, 디소피라미드, 프로파페논, 리도카인 등), 항경련약(페노바르비탈, 페니토인, 카르바마제핀, 프리미돈 등), 진정수면제 (미다 졸렘 등)와 병용시 이러한 약들의 효과가 떨어질 수 있으므로 투여 시작시와 종료시 이러한 약들의 효과에 대한 신중한 모니터링 실시가 필요하다.

(2) 경구 또는 주사용 피임제(에티날레스트라디올, 데스게스트렐, 노르에티스테레, 레보 노르에스트렐 등) 또는 이 약물을 포함한 피임 기구(이식제 포함) 등의 효능 감소 및 부정 성기출혈의 발현율이 증가할 수 있다.

(3) 편두통치료제(수마트립탄, 나라트립탄, 리자트립탄, 졸미트립탄 등)와 병용시 이러한 약들의 이상반응이 증가할 수 있다.

(4) 선택적세로토닌재흡수저해제 등 항우울제(이미프라민, 아미트립틸린, 노루트립틸린, 시탈로프람, 플루록세틴, 플루복사민, 파록세틴, 설프랄린, 네파조돈, 에스시탈로프람, 벤라팍신 등)와 병용시 구역, 구토, 불안, 안절부절, 혼란이 나타나는 등 이상 반응이 증가할 수 있다.

(5) 메사돈 : 메사돈 혈장 농도 및 효과의 감소를 초래할 수 있다. 메사돈 치료를 받는 환자에서 47%까지 감소한 보고가 있다.

(6) 지질저해제(심바스타틴과 같은 특정 HMG-CoA reductase 저해제(프라바스타틴은 제외))와 스테로이드 호르몬(경구용 또는 정맥 투여용)의 작용에 영향을 끼칠 수 있다.

(7) 비스테로이드성 소염진통제 및 COX-2 저해제 등의 관절염치료제, 칼슘채널 차단제 등의 혈압강하제, 경구용 혈당강하제(metformin) 또는 기타 혈당조절제, 마약성 진통제 등도 이약과 잠재적 상호작용이 발생할 수 있다.

3) 정해진 용법·용량을 준수합니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 의약품 원래 용기에 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관합니다.
- 3) 직사광선(햇볕)을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적은 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관합니다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~25℃)보관

[포장단위] 60정(10정/PTPX6), 120정(10정/PTPX12), 10정(10정/PTPX1), 300정/병, 30정/병

[제조사] (주)유유제약 / 충북 제천시 바이오밸리 1로 94

※ 본 의약품은 KGMP 적격업체에서 생산하여 엄격한 품질 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기준이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국 및 의약품 판매자를 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의 및 확인은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr) 또는 홈페이지(www.yuyu.co.kr)나 크로바리우스(수신자자유 부담) 080-070-0701으로 하시기 바랍니다.
※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국 의약품안전 관리원에 할 수 있습니다.

신청방법: 1644-6223, 14-3330, | karp.drugsafe.or.kr,

신청대상: 의약품 부작용으로 사망, 장애, 질병 피해를 입은 환자 및 유족,

보상범위: 사망일시보상금, 장례비, 장애일시 보상금, 진료비

※ 첨부문서 개정연월: 2022년 11월 29일

유유제약

서울사무소: 서울시 중구 동호로 197 유유빌딩
본사 · 공장: 충북 제천시 바이오밸리 1로 94

Under the agreement of
Dr. W. Schwabe, Karlsruhe, Germany