

※ 의약품 사용하시기 전에 아래 내용을 주의깊게 읽고 사용하십시오.

게루삼엠정은 제산작용(制酸作用), 국소보호작용(局所保護作用), 점막수렴작용(粘膜收斂作用)을 지니고 위·십이지장궤양(胃·十二指腸潰瘍)을 비롯하여 위산과다(胃酸過多), 위염(胃炎) 등 소화기질환(消化器疾患)의 증상개선에 유용하게 사용되고 있다.

【성분·함량】 1정 중

주성분 : 건조수산화 알루미늄겔(K.P.) 392mg
(수산화알루미늄으로서 300mg)

【성상】 백색의 원형정제

【효능·효과】

1. 주요효과
다음질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다

※ 다른 용도 사용시 심한 부작용이 나타날 우려가 있으니 주의하십시오.

【용법·용량】

성인 : 수산화알루미늄으로서 1회 300~600mg(1~2정), 1일 3회 식간(식사와 식사 사이)에, 경구투여(복용)한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

- ※ 만약 유통과정중 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국, 병원 개설자에 한하여 교환해 드립니다.
※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kida.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품등정보」를 참조하십시오.



일반의약품
분류번호: 02340

제산·점막보호위장제

게루삼M정

1,000정



삼남제약주식회사

KGMP 공장: 충남 금산군 금산읍 상리 99-1
소비자 상담창구: 041-754-3771

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
투석요법을 받고 있는 환자
(장기투여에 의해 알루미늄뇌증, 알루미늄골증이 나타날 수 있다.)
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
1) 인산염 결핍환자
2) 신장장애(신장장애) 환자(장기투여에 의해 알루미늄뇌증, 알루미늄골증이 나타날 위험이 있으므로 정기적으로 혈중알루미늄, 인, 칼슘, 알칼리로스파타제 등을 측정한다.)
3. 부작용
1) 소화기계 : 때때로 변비 드물게 구역, 구토 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량, 휴약(복용중지) 또는 완하제를 병용(함께 복용)하는 등 적절한 처치를 한다.
2) 장기투여 : 장기투여에 의해 알루미늄뇌증, 알루미늄골증이 나타날 위험이 있으므로 신중히 투여한다.
4. 상호작용
1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용(함께 복용)투여 하지 않는다.
2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH상승에 의해 병용 약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여한다.
5. 일반적 주의
1) 장기 연용(계속 복용)을 하지 않는다.
2) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다.

주의·부작용
개정일자: 091001

제조번호 :

사용기한 :

까지



분리배출