

3중 작용의 기능성 소화제

속시나제 삼중정

일반의약품 | 분류번호 232(소화성궤양용제)


속시나제는 단계별로 효과발현(드러냄)이 되도록 처방설계된 삼중정입니다. 상층과 하층의 제산제는 위내 pH를 정상화하여 위산과다, 속쓰림을 개선하며 중층의 위장운동조절제인 트리메부틴말레산염은 약해진 위운동을 정상화시켜 주고, 소화효소제는 소화운동을 촉진합니다. 속시나제 삼중정은 위장운동조절, 소화촉진 및 제산 등의 복합작용을 발휘해 광범위한 위장질환에 뛰어난 증상개선 효과를 나타냅니다.

원료약품의 분량 (1정중)

상층	
메타규산알루미늄산마그네슘 (KP).....	14.55mg
(건조물로서 Al ₂ O ₃ 로서 4,70mg, MgO로서 1,85mg)	
탄산수소나트륨 (KP)	18.18mg
침강탄산칼슘 (KP)	36.37mg
중층	
디아스타제·프로테아제·셀룰라제 2000IV(KP).....	20.0mg
리파제AP6(별규).....	7.5mg
감초가루 (KHIP).....	25.0mg
(글리시리진산으로서 0,63mg)	
스코폴리아엑스 (KP)	5.0mg
트리메부틴말레산염 (KP).....	50.0mg
하층	
메타규산알루미늄산마그네슘 (KP)	25.45mg
(건조물로서 Al ₂ O ₃ 로서 8,22mg, MgO로서 3,23mg)	
탄산수소나트륨 (KP)	31.82mg
침강탄산칼슘 (KP)	63.63mg

성상

이 약은 상·하층은 백색내지 유백색이고, 중간층은 연갈색으로 된 원형의 삼중정입니다.



효능·효과

소화성 궤양에 따른 다음 증상의 개선 : 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체[위체(체함)], 구역, 구토, 위통, 신트림, 소화불량

용법·용량

성인 1회 2정, 1일 3회 매 식간(식사 2~3시간 후)에 복용합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

1. 다음 환자에게는 투여하지 마십시오.

- 1) 투석요법을 받고 있는 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. (복용 전에 의사, 약사와 상의하십시오.)

- 1) 이 약으로 알레르기 증상 [발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 일]이 있는 환자
- 2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
- 3) 신장애(신장장애) 환자
- 4) 간장에 환자
- 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 6) 임신중 저하가 있는 환자
- 7) 혈압이 높은 환자 또는 고령자(노인)
- 8) 심장에 장애가 있는 환자
- 9) 부종(부기)이 있는 환자

※5030081-1150212

3. 부작용

- 1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의합니다.
- 2) 이 약을 투여함으로써 드물게 동계(두근거림), 졸음, 현훈(어지러움), 권태감, 두통이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의합니다.
- 3) 이 약을 투여하는 동안 드물게 변비 또는 입이 마르는 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의합니다.
- 4) 순환기계: 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있습니다.
- 5) 간장: 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있습니다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 이 약의 복용에 의해 노력이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담하십시오.
- 2) 위알도스테론증: 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기연용(계속복용)할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지하십시오.
- 3) 근병증(근육병증): 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지하십시오.

5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의합니다.
- 3) 장기연용(계속복용)을 하지 않습니다.
- 4) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용 전에 의사 또는 약사와 상의합니다.

6. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의하십시오.

칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로로메치아지드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여하십시오.

7. 상호작용

위장진통·진경(경련완화)제와 병용투여하지 않습니다.

8. 소아·임부에 대한 투여

- 1) 이 약은 소아(15세미만)에게는 투여하지 않습니다.
- 2) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유중인 부인에게는 투여하지 않습니다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

저장방법

차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나, 직사광선이 닿는 곳에 보관하지 마십시오.
습기, 열, 빛은 약의 효과와 안정성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의 바랍니다.

포장단위

10, 300정

○ 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

○ 이 설명서는 2015년 2월 12일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

일동제약주식회사

본사: 서울특별시 서초구 바우로27길 2
공장: 경기도 안성시 공단로 25
소비자상담실: (전화) 080-022-1010 (수신자부담)

※5030081-1150212