

원료약품 및 그 분량

1정(122mg) 중

•유효성분 : 아플로쿠알론(JP) ······ 20.0mg

•기타 첨가제 : 디만니톨, 옥수수전분, 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이트(Y-1-7000)

성상

흰색의 원형 필름 코팅정

효능·효과

1. 다음 질환으로 인한 근긴장상태의 개선 : 경견완중후군, 요통증
2. 다음 질환으로 인한 경성(痙攣)마비 : 뇌혈관장애, 뇌성마비, 경성척수마비, 척수혈관장애, 경부척추증, 후종인대(後從韌帶) 골화증, 다발성 경화증, 근위축성 측색경화증, 척수소뇌변성증, 외상후유증(척수손상, 두부외상), 수술후 후유증(뇌·척수종양을 포함), 기타 뇌척수 질환

용법·용량

성인 : 아플로쿠알론으로서 1회 20mg 1일 3회 경구투여합니다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

사용상의 주의사항

1. 부작용

- 1) 정신신경계 : 때때로 비틀거림, 어지러움, 졸음, 드물게 두통, 두중 등이 나타날 수 있습니다.
- 2) 소화기계 : 때때로 구역, 식욕부진, 복통, 위부불쾌감, 드물게 구토, 설사, 구갈, 변비, 복부팽만감, 위염 등이 나타날 수 있습니다.
- 3) 피부 : 드물게 광선과민증이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.
- 4) 과민증 : 때때로 발진, 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.
- 5) 기타 : 때때로 무력감, 권태감, 드물게 부종, 이명, 빈뇨, 구내염이 나타날 수 있습니다.

2. 일반적 주의

졸음, 반사운동능력의 저하 등이 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의합니다.

3. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
- 2) 수유중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 수유중에는 투여를 피하고 부득이한 경우에는 수유를 중단합니다.

4. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 적습니다.).

5. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의합니다.

저장방법

차광·기밀용기, 실온보존

포장단위

100정/PTP(10정/PTP x10), 500정/병

제조사
에이치케이이노엔주식회사
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239
고객상담센터:080-700-8802
<http://www.inno-n.com>

FD-850517

LD-200327

• 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 유통과정 중 잘못으로 인하여 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자를 통하여 교환하여 드립니다.

• 이 첨부문서 작성일자(2020년 03월 27일)이후 변경된 내용은 <http://www.inno-n.com> 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr> ➡ 의약품등 정보)에서 확인할 수 있습니다.

• 부작용 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(<https://www.drugsafe.or.kr> ➡ 의약품 부작용 피해구제, 대표전화: 1644-6223)에 할 수 있습니다.

• 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<https://www.drugsafe.or.kr> ➡ 의약품 이상사례 보고)에 알리도록 하십시오.

• 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 보관하세요. • 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

• 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마세요. • 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마세요.

Ⓢ = 등록상표

631241109