

유레틴®정 (아조세미드)

URETIN®Tab. (Azosemide)

- **원료약품의 분량** : 1정 중
유효성분 : 아조세미드(별규).....60mg
첨가제(동물용우레신분) : 유당수화물(소, 우유)
기타첨가제 : 규산마그네슘, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 저지환도하드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 셀크, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프록셀로오스

■ **성상** : 백색의 타원형 필름 제형정

■ **효능·효과**
심성부종(울혈성 심부전), 신성부종, 간성부종

■ **용법·용량**
성인 : 아조세미드로서 1일 1회 60mg을 경구투여 한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 중증의 간기능장애 환자(간성혼수 환자)
 - 저나트륨·저칼륨혈증 환자
 - 무뇨 환자
 - 혈액량이 현저히 감소하여 혈압이 저하된 환자
 - 설문조사에 의거하여 과민증 환자(교차반응이 나타날 수 있다.)
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 진행성 간경변 환자(간성혼수가 나타날 수 있다.)
 - 심한 관동맥경화증 또는 뇌동맥경화증 환자(경격하 이뇨가 나타날 경우, 급속한 혈장량 감소·혈액 농축을 일으켜 혈전색전증이 나타날 수 있다.)
 - 간질환·간기능장애 환자
 - 중증의 신장애 환자
 - 빈인 또는 양친이나 형제중에 통풍이나 당뇨병이 있는 환자
 - 영아(영아는 전해질평형실조가 나타날 수 있다)
 - 설사, 구토 환자
 - 디기탈리스, 당질부신피질호르몬 및 부신피질자극호르몬의 투여를 받고 있는 환자
 - 염제한요법 환자
- 부작용
 - 대사 : 때때로 저칼륨혈증, 저나트륨혈증, 저염소혈증증 알칼리증 등의 전해질평형실조, 고노산혈증, BUN·혈청크레아티닌의 상승, 드물게 고혈당 이 나타날 수 있으므로 충분한 관찰하고 이상이 인정되는 경우는 감량 또는 휴약 등 적절한 처치를 한다.
또한 통풍(발성 소인)이 있는 환자, 일시적인 콜레스테롤·중성지방 상승이 나타날 수 있다.
 - 과민증 : 때때로 발진, 드물게 아나필락시스 등 속이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
 - 정신신경계 : 드물게 어지러움, 이명, 두통 등이 나타날 수 있다.
 - 순환기계 : 저혈압, 저혈압에 의한 혈전성(특히 치료초기의 고형자)이 나타날 수 있으며, 심한 경우 순환허탈(특히 고령자)이 나타날 수 있다.
 - 소화기계 : 드물게 식욕부진, 구역, 구토, 위부불쾌감, 설사, 구갈, 체장염 등이 나타날 수 있다.
 - 배뇨생식기계 : 배뇨장애의 약효는 지속, 급성 간질성 신염이 나타날 수 있다.
 - 혈액 : 빈혈, 백혈구감소, 혈소판감소, 무과립구증이 나타날 수 있다.
 - 간장 : 때때로 ALT, AST, ALP의 상승이 나타날 수 있으므로 이러한 경우 에는 감량 또는 투여를 중지한다.
 - 눈 : 시각장애가 나타날 수 있다.
 - 귀 : 드물게 청각장애가 나타날 수 있다.
 - 기타 : 혈관염, 드물게 무력감, 관대성, 관절통이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
 - 이 약의 이뇨작용은 급격히 나타날 수 있으므로 전해질평형실조, 탈수에 특히 주의하여 저용량에서 투여를 시작하여 천천히 증량한다.
 - 연용하는 경우에는 전해질평형실조가 나타날 수 있으므로 정기적으로 검사 한다.
- 상호작용
 - 유사약(푸로세미드)과 테르페나딘의 병용투여시 QT연장, 심실성 부정맥이

- 발생되었다는 보고가 있으므로 병용투여하지 않는다. 또한, 이 약과 아스테미졸의 병용투여시 QT연장, 심실성 부정맥을 일으킬 수 있으므로 병용투여 하지 않는다.
- 혈압강화제의 투여를 받고 있는 환자에게 이 약을 병용투여하는 경우에는 혈압강화작용이 증가할 수 있으므로 혈압강화제의 용량 조절에 주의한다.
 - 이 약에 의해 스트렙토마이신, 카나마이신 등 제 8뇌신경장애를 일으킬 수 있는 아미노글리코사이드계 항생물질 및 시스플라틴의 청각장애가 증가될 수 있으므로 이러한 항생물질과의 병용 투여는 바람직하지 않다.
 - 이 약에 의해 세팔로린나트륨, 세파로리딘에 의한 신독성이 증가될 수 있으므로 이 약과 병용투여하는 경우에는 신중히 투여한다.
 - 투보쿠라민 및 그의 유사작용 물질의 마비작용을 증가시킬 수 있으므로 수술 전의 환자에게 이 약을 투여하는 경우에는 일시적으로 투여를 중지 하는 등의 처치를 한다.
 - 이 약 투여 중에는 혈당강화제의 작용이 현저히 감소될 수 있으므로 주의한다. 디기탈리스의 심장에 대한 작용을 증가시킬 수 있으므로 병용투여하는 경우에는 신중히 투여한다.
 - 당질부신피질호르몬 또는 부신피질자극호르몬, 하제와 병용투여하는 경우에는 칼륨배출이 증가할 수 있으므로 신중히 투여한다.
 - 에피네프린이나 노르에피네프린 등의 혈압상승성 아민에 대한 혈관벽의 반응성을 감소시킬 수 있다.
 - 고용량의 살리실산계 약물과 병용투여하는 경우에는 중추신경계에 대한 살리실산계 약물의 독성이 증가할 수 있다.
 - 신장을 통한 리튬배설이 감소되어 리튬에 의한 심독성 및 신경독성이 증가 될 수 있으므로 신중히 모니터링하고 용량을 조절한다
 - 비스테로이드성 소염진통제 및 항류마티스약물과 병용투여하는 경우에는 이 약을 비롯한 이뇨제의 이뇨 및 혈압강화작용이 증가될 수 있으며 혈액량 감소 환자에는 급성 신부전을 일으킬 수 있다.
 - 테오필린 작용이 증가될 수 있다.
 - 일부 및 수유에 대한 투여
 - 동물실험(캣, 마우스)에서 생후에는 소실되는 일시적인 골격이상이 인정 되었다는 보고가 있으므로 일부(2개월~6개월) 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
 - 이 약은 모유생성을 억제하고 모유중으로의 이행이 보고되어 있으므로 투여를 피하고 투여한 경우에는 수유를 중단한다.
 - 소아에 대한 투여
미국아, 신생아, 영아 및 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.(사용경험이 없다.)
 - 고령자에 대한 투여
고령자에는 다음 사항을 주의하여 저용량에서 투여를 시작하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다.
 - 고령자에서의 급격한 이뇨는 혈장량의 감소를 초래하므로 탈수, 저혈압 등에 의한 기립성 조절장애, 어지러움, 실신 등이 나타날 수 있다.
 - 특히 심한 탈수 증 부종이 있는 고령자에서의 급격한 이뇨는 급속한 혈장량감소·혈액농축을 초래하여 뇌경색 등의 혈전색전증이 나타날 수 있다.
 - 일반적으로 고령자에서의 과도한 혈압강화는 바람직하지 않다.(뇌경색이 나타날 수 있다.)
 - 고령자에서는 저나트륨혈증, 저칼륨혈증이 나타날 수 있다.
 - 적용상의 주의
아간에 휴식이 필요한 환자에게는 아간배뇨를 피하기 위해 주간 투여하는 것이 바람직하다.

■ 저장방법 : 차광기밀용기

■ 포장단위 : 30, 300정

- ※ 의사·약사의 지시에 따라 사용하십시오.
※ 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.
※ 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 약국 등의 개설회사에 한하여 교환하여 드립니다.
※ 본 첨부서 문안 개정일자(2016년 07월 28일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr) 또는 소비자 상담실(신수부담 전화 080-082-1234)에서 확인하실 수 있습니다.
※ 제품의 사용기한은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다

08017
URT-03-14-1171

제조판매원
SAMJIN 삼진제약주식회사

본 사 : 서울특별시 마포구 와우산로 121 (서교동)
공 장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52
☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031) 353-1712/6

원료공급 및 기술제휴
SKK