

전문약품
분류번호: 217

이소캣서방캡슐120밀리그램

(이소소르비드이질산염)

isoket® retard 120mg
ISOSORBIDE DINITRATE

【용법·용량】
성인 : 이소소르비드이질산염으로서 1일 1회 120mg을 아침식
사후 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 급성 순환기능부전(쇼크, 혈관허탈) 환자
- 중증의 저혈압(수축기압 90mmHg 미만) 환자
- 폐쇄우각형 녹내장 환자
- 이 약 또는 질산염제제에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
- 두부외상 또는 뇌출혈 환자
- 교착성 심낭염 환자
- 심낭압전 환자
- 심근의 비대 폐색, 심근장애(심장내부가 좁아지는 심근의 이
상) 환자
- 낮은 총만압, 즉 급성 심근경색, 좌심실 기능손상(좌측 심장
마비) 환자. 수축기압이 90mmHg 아래로 떨어지는 것을 피해
야 한다.
- 충분히 높은 종말 확장기압이 적절한 처치에 의해 유지되지
않는 심장성 쇼크 환자

- 3) 운전이나 기계조작의 반응성에 영향을 미칠 수 있으므로
주의를 기울여야 한다. 이러한 영향은 알코올과의 병용
투여시 증가될 수 있다.

5. 상호작용

- 이 약과 테르페나딘, 아스테미졸의 병용투여시 QT 연장, 심
실성 부정맥을 일으킬 수 있으므로 병용투여 하지 않는다.
 - 혈관확장제, 칼슘길항제, β 차단약 등과 같은 혈압강하제,
삼한제 항우울제, 신경이완제 및 알코올과의 병용에 의해
혈압강하작용이 증강될 수 있다. ACE 억제제를 복용하는
환자에서 순환 허탈 증상이 나타날 수 있다.
 - 이 약과 포스포디에스테라제5형저해제(예: 실테나필, 타다나
필, 바데나필)와의 병용투여는 본제의 혈압저하효과를 증가
시켜 협심증 발작등과 같이 심각한 순환기계 이상반응을 일
으킬 수 있다. 따라서, 이약을 복용하고 있는 경우 포스포디
에스테라제5형저해제를 병용해서는 안된다. 최근에 이를 복
용한 환자에게도 급성으로 질산염제제를 투여하면 안된다.
 - 디히드로에르고타민과의 병용투여시 DHE 레벨이 증가되
고 혈압상승효과가 증강될 수 있다.
 - 사프롤테린 (테트라하이드로비오테린 BH4)는 산화질소
(NO) 합성을 위한 보조인자이다. 전형적인 산화질소 공여
제 (즉, 니트로글리세린, 이소소르비드이질산염, 이소소르
비드일질산염 등)를 포함하여 산화 질소 기전 또는 작용에
영향을 미치므로 혈관 이완을 유발하는 모든 약물과 사프롤
테린 함유 제제를 병용하는 동안 주의가 권장된다.
 - 본 제제와 가용성 구아닐산고리화효소 자극제인
리오시구앗제제의 병용투여는 저혈압을 야기할 수
있으므로 금지한다.
- 6. 임부 및 수유부의 투여**
1) 이 약이 사람의 생식능에 미치는 영향은 연구되지 않았다
2) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임
부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의
유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한
다(의사의 지시가 없는 한 임신초기 3개월간은 투여하지 않

【원료약품 및 그 분량】1캡슐 중
유효성분 :이소소르비드이질산염 (별 규)120.0mg
동불유래성분: 유당수화물(건강한 젖소/우유)
기타첨가제 : 공캡슐, 슈가스피어스, 셀락, 에틸셀룰로오스, 텔크
【성상】
흰색의 내용물이 든 연분홍색의 서방형 캡슐
【효능·효과】
1. 협심증, 심근경색, 관경화증(만성허혈성심질환, 무증후성허
혈성심질환, 동맥경화성심질환)
2. 울혈성심부전의 보조요법(강심배당체 또는 이노제와 병용)
【용법·용량】
성인 : 이소소르비드이질산염으로서 1일 1회 120mg을 아침식
사후 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 급성 순환기능부전(쇼크, 혈관허탈) 환자
- 중증의 저혈압(수축기압 90mmHg 미만) 환자
- 폐쇄우각형 녹내장 환자
- 이 약 또는 질산염제제에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
- 두부외상 또는 뇌출혈 환자
- 교착성 심낭염 환자
- 심낭압전 환자
- 심근의 비대 폐색, 심근장애(심장내부가 좁아지는 심근의 이
상) 환자
- 낮은 총만압, 즉 급성 심근경색, 좌심실 기능손상(좌측 심장
마비) 환자. 수축기압이 90mmHg 아래로 떨어지는 것을 피해
야 한다.
- 충분히 높은 종말 확장기압이 적절한 처치에 의해 유지되지
않는 심장성 쇼크 환자

는다.).

- 3) 수유 중 투여에 대한 유아의 위험에 대해서 사용 가능한 근
거는 불확실하거나 부적합하다. 질산염 제제가 모유 중으로
이행한다는 자료가 있으며 이는 유아에게 메트헤모글로빈
혈증을 유발할 수 있다. 이소소르비드이질산염의 배설의 정
도 및 이의 대사체의 모유 중으로의 이행은 밝혀지지 않았
으므로 의사의 지시에 의해 필수적인 경우를 제외하고는 수
유 중에는 투여를 피한다.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 간기능이 저하되어 있는 경우가 많아
높은 혈중농도가 지속될 수 있으므로 신중히 투여한다.

9. 과량투여시의 처치

1) 증상

- 수축기압 90mmHg 이하로의 혈압 저하, 창백, 발한, 약
한 맥박, 빈맥, 기립성 어지러움, 두통, 무기력, 어지러움,
구역, 구토, 설사
- 다른 질산염제제를 투여받는 환자에서서 메트헤모글로
빈혈증이 보고되었다. 이소소르비드일질산염 생체내변
환동안 질산 이온이 방출될 때, 빠른 호흡, 불안, 실신,
심장마비 동반한 메트헤모글로빈혈증과 청색증을 일으
킬 수 있다. 이소소르비드이질산염의 과량 투여시 이러한
이상반응의 발생을 배제할 수 없다.
- 매우 높은 용량에서 두개 내압 증가할 수 있다. 이는 대뇌
증상을 일으킬 수 있다.

2) 처치

일반적 처치

- 약물 복용 중단
- 질산염제제 관련 저혈압 발생시 일반적 처치 :
－ 환자는 반드시 머리를 낮추고 다리를 든 채로 누워야
한다.

- 이 약을 복용중인 환자에게 포스포디에스테라제5형저해제
(예 : 실테나필, 타다나필, 바데나필)을 투여해서는 안된다.
- 중증의 저혈량증 환자
- 중증의 빈혈 환자
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성
(galactose intolerance), Lapp유당분해효소 결핍증(Lapp
lactase deficiency)또는 포도당－갈락토오스 흡수장애(glu-
cose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는
환자에게는 투여하면 안된다.
- 이 약을 복용중인 환자에게 가용성 구아닐 산－
고리화효소 자극제인 리오시구앗제제를 투여해서는
안된다 (5. 상호작용 항 참조).

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 저혈압 환자
- 원발성 폐고혈압 환자
- 대동맥관협착증, 승모관협착증 환자
- 기립성 조절장애 환자
- 두개내압이 상승된 환자(지금까지 추가적인 내압상승은 고
용량 글리세릴 트리니트레이트의 정맥주사후에만 관찰되
었다).
- 감상신기능저하증 환자
- 저체온증 환자
- 영양실조증 환자
- 중증 간질환 또는 신질환 환자

3. 이상반응

이상반응 빈도는 다음과 같이 정의된다:매우 흔하게
(≥1/10), 흔하게 (≥1/100, <1/10), 흔하지 않게 (≥1/1,000,
<1/100), 드물게 (≥1/10,000, <1/1,000), 매우 드물게
(<1/10,000), 빈도불명 (가능한 데이터로부터 추정할 수 없
음).
이 약 투여 중 다음과 같은 이상반응이 나타날 수 있다.

- － 산소 공급
 - － 혈장 볼륨 확대(수액 주사)
 - － 특별한 쇼크 치료(중환자실로의 입원)
 - 특별한 처치
 - 만약 혈압이 매우 낮다면 혈압 상승시킬
 - 적절한 수액소생법에 반응하지 않는 환자에게만 혈관수
축제 투여
 - 메트헤모글로빈혈증의 치료
 - － 비타민C, 메틸렌블루, 톨루딘블루에 의한 저해 요법
 - － 산소 투여(필요시)
 - － 인공 환기
 - － 혈액 투석(필요시)
 - 소생 조치 :
호흡과 순환정지의 경우에는 즉시 소생술 시행
- 10. 적응상의 주의**
섭어서 복용하는 경우, 일시적인 혈중농도상승에 따른 두통
이 생기기 쉬우므로 부수거나 씹지 말고 그대로 복용한다.

11. 기타

1) 이 약은 급성 협심증의 응급처치 목적으로는 적합하지 않다.

【포장단위】 100캡슐 (10캡슐*10PTP)

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 제조일로부터 60개월

- ※의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- ※사용 기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- ※첨부문서를 읽고 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- ※본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거
교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- ※구입시 사용 기한이 지났거나 변질・변패・오염되거나
손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※의약품에 관한 문의는 소비자 상담전화 02-568-7328로
하여 주시기 바랍니다.
- ※첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우
의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원
(http://www.drugsafe.or.kr)에 알립니다.
- ※부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

발현부위	빈도	이상반응
순환기계	흔하게	빈맥, 기립성 저혈압
	흔하지 않게	협심증 악화, 때때로 서맥성 부정맥과 실신을 동반하는 허탈상태
	빈도불명	저혈압, 열감, 두근거림
정신신경계	매우 흔하게	두통
	흔하게	어지러움, 졸림
	빈도불명	불쾌감, 이명
소화기계	흔하지 않게	구역, 구토, 위부불쾌감, 식욕부진
	매우 드물게	가슴쓰림
간장	빈도불명	AST, ALT상승
피부 및 피하조직질환	흔하지않게	알러지 피부 반응(예:발진), 홍조
	매우 드물게	혈관부종, 스티븐스존슨 증후군(SJS)
	빈도불명	박탈성피부염
전신질환	흔하게	무력증

질산염제제에서 구역, 구토, 초조, 창백, 발한 등의 증상을
보이는 중증의 혈압강하효과가 보고되었다.

이 약의 투여에 의해 메트헤모글로빈혈증이 나타났다는 보
고가 있다.

산소교환이 불충분하게 이뤄진 폐포 부위에서 혈류가 상대
적으로 재분배되므로 본제제의 투여는 동맥혈관 내 산소환
량을 갑자기 감소(저산소혈증)시킬 수 있다. 이 때문에 특히
관상동맥질환 환자에서 심근허혈이 일어날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 이 약 사용중에 이 약 또는 다른 질산염제제에 대해 내약성
이 생겨 작용이 감소될 수 있다. 이러한 작용의 감소나 손실
을 막기 위해서는 이 약 고용량을 계속적으로 투여하지 않
는다.
- 질산염제제를 투여받는 환자에게 포스포디에스테라제5형
저해제(예: 실테나필, 타다나필, 바데나필)를 투약하지 말도
록 알려주어야 한다. 협심증 발작의 위험을 증가시킬 수 있
으므로 포스포디에스테라제5형저해제의 복용 중 질산염제
제를 투여해서는 안된다.

※의약품의 상세 정보 및 이 첨부문서 작성일 이후 변경된 내용은
자사 홈페이지(www.elyson.co.kr) 또는 온라인의약도서관
(http://drug.mfds.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

첨부문서작성일 : 2017년 10월 23일

[제 조 자]

Aesica Pharmaceuticals GmbH

Gaileistrasse 6, 08056 Zwickau, Germany

[제 조 자] (포장)

Aesica Pharmaceuticals GmbH

Mittelstrasse 15 40789 Monheim, Germany

[수 입 자]

에리슨제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제막공단3길 95

[판 매 자]

KPP (주)경풍약품

서울특별시 강남구 논현로64길 18 경풍빌딩
TEL : 02)568-7328