

진해제

코데논정

분류번호 : 222

전 문 의 약 품

한 외 마 약

■원료약품 및 그 분량 : 1정 중

주석산수소디히드로코데인(BP)	5mg
클로르페니라민말레산염(KP)	1.5mg
dl-메틸에페드린염산염(KP)	17.5mg
카페인무수물(KP)	20mg

■성 상 : 백색의 원형정제

■효능·효과 : 기침, 가래

■용법·용량 : 성인 - 1회 2정, 1일 3회 식후 및 취침시 복용한다.

소아 - 11세이상 15세미만 : 1~2정

8세이상 11세미만 : 1정

■저장방법 : 기밀용기

■포장단위 : 1000T

KGMP적격업체제품

CODENONG

1000 Tabs.

■사용상의 주의사항 : 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2. 다음 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의 할 것. 1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 알레르기성비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람. 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 일이 있는 사람. 3) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병 등 병이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람. 4) 심장에 장애가 있는 사람, 혈압이 높은 사람 또는 고령자(염산페닐프로판올아민, 염산메톡시페나민, 염산메칠에페드린, 염산에페드린, 염산슈도에페드린을 함유하는 제제) 5) 임부 또는 임신하고 있다고 생각되는 부인, 수유부. 6) 의사의 치료를 받고 있는 사람. 3. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것. 1) 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 다음 약들과 동시에 복용하지 말 것. 다른 진해 거담제, 감기약, 항히스타민제, 진정제 등 3) 소아에 복용시킬 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것. 4) 7세 이하의 소아는 시럽제를 복용시킬 것. 5) 3개월 미만의 유아에게는 복용을 피하고, 3개월 이상도 1세 미만의 유아에게는 부득이 한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다. 4. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의할 것. 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차운전 또는 기계류의 운전조작을 피할 것. 3) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 5. 보관 및 취급상의 주의 1) 소아의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것. 2) 직사일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

● 이 첨부문서 작성일자 2012년 11월 05일 이후 변경된 내용은 홈페이지 www.dkpc.co.kr 나 ☎ 080-776-1472 에서 확인할 수 있음

○ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) ▷ 「정보마당」 ▷ 「의약품등 정보」를 참조하세요.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다. DK051112

제조번호 :

사용기한 :



동광제약주식회사

경기도 평택시 산단로 115

●수신자부담 소비자상담실: 080-776-1472