

전문 의약품

KGMP 적격업체 제품

항정신성의약품

불면증 치료제

트리람정 0.25mg

트리아졸람 0.25mg

트리람정 0.25mg은 벤조디아제핀 계열의 최면진정제로서, 수면진속작용과 항불안 작용이 특히 우수하여 단기적인 불면증의 치료제로 사용되며 항우울제의 효능을 방해하지 않으므로 항우울제를 투여받고 있는 환자의 불면증 치료 시에도 효과가 좋습니다.

트리람정 0.25mg은 적은 용량(0.25mg)으로 신속하면서도 깊은 수면을 유도하여 반감기가 2.7시간으로 비교적 짧아 체내에 축적되지 않으므로 숙면 후에 졸음, 현기증 등의 이상반응이 거의 나타나지 않습니다.

■ 원료약품의 분량 : 1정 중

트리아졸람(USP) 0.25mg
• 첨가제(동물유래) : 유당수화물
• 첨가제(타르색소) :
형색 2호(인디고카르민) 알루미늄레이크

■ 성상 : 담청색의 타원형 정제

■ 효능·효과 : 불면증의 단기간 치료

■ 용법·용량

이 약은 단기간(보통 7~10일) 투여되어야 하며, 치료기간은 최대 2~3주를 초과하지 않습니다. 최대의 효과를 얻고 증증의 부작용을 피하기 위해서는 용량을 개인별로 정하는 것이 바람직하며, 최소유�효용량이 투여되어야 합니다. 처방용량을 증가시키지 않도록 주의하여야 하며, 저용량에서 반응하지 않아 부득이하게 용량을 증량하는 경우 이상반응이 용량의존적으로 나타나므로 환자를 충분히 관찰하면서 신중히 투여해야 합니다.

1. 성인 : 환자에 따라 트리아졸람으로서 0.125~0.25mg을 취침 전에 경구투여합니다. 이상반응이 용량의존적으로 수면 운전이 보고된 환자는 초과하는 용량은 투여가 권장되지 않습니다.
2. 고령자 및 쇠약 환자 : 초회량으로 트리아졸람으로서 0.125mg을 투여합니다. 저용량에서 반응하지 않을 경우 0.25mg을 투여할 수 있으나 0.25mg을 초과하지 않습니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

- 1) 수면 운전(즉, 수면진정제 복용 후 완전히 깨지 않은 상태에서 운전하며 환자는 이를 기억하지 못함)과 같은 복합 행동이 보고되었습니다. 이러한 이상반응은 수면진정제를 처음 복용한 환자 뿐 아니라 복용을 한 경험이 있는 환자에서도 나타났습니다. 비록 치료 농도에서 이 약을 단독으로 투여하였을 때도 수면운전과 같은 행동이 나타날 수 있지만, 알코올이나 다른 중추신경 억제제와 함께 복용했을 때나 권장용량을 초과하여 복용하였을 때 이러한 행동이 나타날 위험이 증가합니다. 환자와 환자 주변에 위험을 줄 수 있으므로 수면 운전이 보고된 환자에서 이 약의 투여를 중단할 것이 심각하게 고려되어야 합니다. 수면 진정제 복용 후 완전히 깨지 않은 환자의 다른 복합 행동(음식준비, 음식먹기, 전화하기, 성관계)이 보고되었습니다. 수면 운전과 같이 환자들은 이러한 행동을 대체로 기억하지 못합니다.

- 2) 증증의 아나필락시스 반응
수면 진정제를 처음 복용한 환자에서나 지속적으로 복용하는 환자에서 혀, 상대문, 후두의 혈관 부종(angioedema)이 드물게 보고되었습니다. 일부 환자에서기는 아나필락시스 반응을 암시하는 호흡곤란과 인후폐쇄(throat closing), 구역, 구토와 같은 증상이 보고되었습니다. 일부 환자는 응급 치료가 필요하였습니다. 혀, 상대문, 후두, 호흡기관 폐쇄를 포함한 혈관부종이 발생할 수 있으며 환자생명을 치명적일 수 있습니다. 이 약 복용 후 혈관부종이 발생한 환자에게 이 약을 재투여해서는 안됩니다.

3) 중추신경계 증상

- ① 이 약을 10일 정도 계속 투여한 후에 낮 동안의 불안 증가가 보고된 바 있으며 일부 환자의 경우 이는 투여 간 복용중지로 인한 금단증상일 수 있습니다. 이 약으로 치료하는 동안 이러한 낮 동안의 불안 증가가 관찰되면 투여를 중지하는 것이 바람직합니다.
- ② 이 약을 포함한 벤조디아제핀계 수면제의 사용과 관련하여 다양한 이상한 사고 및 행동의 변화가 나타났다고 보고된 바 있습니다. 이러한 변화 중 일부는 알코올이나 다른 중추신경계 억제제(예를 들어, 진정, 수면제)에서 관찰되는 증상과 유사하게 과도한 공격성과 외항성을 나타내며 자제력이 감소하는 특징을 보입니다. 그 밖에 다른 행동변화로는 이상한 행동, 초조, 다관, 이인증이 보고되었습니다. 벤조디아제핀계 약물의 사용과 관련하여 일차적으로 우울증

환자인 경우에는 자살생각을 수반하는 우울증의 악화가 보고되었습니다.

- ③ 위에서 언급된 특이한 이상반응이 이 약으로 인한 것인지, 환자 자발적인 것인지, 정신적 또는 신체적 기저질환에 의한 것인지 명확히 결정하기 어렵습니다. 그럼에도 불구하고, 새로운 행동적, 관념적 증상이 나타나는 경우에는 즉각적이고 주의 깊은 평가가 필요합니다.
- ④ 이 약의 중추신경계 억제효과 때문에 이 약을 복용하는 환자들은 운전이나 기계 조작과 같이 완전한 정신적 민첩성을 요구하는 위험한 직업에 종사하지 않도록 주의해야 합니다. 같은 이유로, 이 약을 복용하는 동안에는 알코올이나 다른 중추신경계 억제제를 병용하는 것에 대해 주의해야 합니다.
- ⑤ 일부 다른 벤조디아제핀계 약물과 같이, 이 약을 치료용량으로 투여한 후 다양한 정도의 선행성 건망증과 역설적 반응이 보고되었습니다. 이 약을 투여한 경우 다른 벤조디아제핀계 약물보다 선행성 건망증이 더 높은 비율로 발생한다는 보고가 있습니다.

2. 다음 환자에게는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 또는 다른 벤조디아제핀계 약물에 과민증 환자
- 2) 일부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
- 3) 급성 폐쇄각막내장 환자
- 4) 다음 약물을 투여 중인 환자 : 케토코나졸, 이트라코나졸, 플루코나졸, 미코나졸, 토루코나졸, 에리트로마이신, 조사마이신, 네파조돈
- 5) 약물 또는 알코올을 의존성 환자
- 6) 급성 호흡부전 환자
- 7) 수면무호흡증후군 환자
- 8) 소아
- 9) 증증의 근무력증 환자
- 10) 비대상성 호흡부전 환자
- 11) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

3. 다음 환자에게는 신중히 투여하십시오.

- 1) 다음 환자에는 투여하지 않는 것을 원칙으로 하나 특별히 필요한 경우에는 신중히 투여합니다 : 폐상심, 폐기종, 기관지천식이나 뇌혈관장애의 급성기에 호흡기능이 저하된 경우(이산화탄소에 의한 혼수를 일으키기 쉽습니다.)
- 2) 고령자
- 3) 쇠약 환자
- 4) 뇌의 기질적 장애 환자
- 5) 심장예 환자
- 6) 간·신장에 환자
- 7) 만성 폐부전 환자
- 8) 척수성 또는 소뇌성 운동실조 환자
- 9) 알코올, 수면제, 진통제, 항정신병약, 항우울약, 리튬에 의한 급성 중독 환자

4. 이상반응

- 1) 의존성 및 금단증상 : 바르비탈계 약물 및 알코올과 유사한 금단증상(경련, 진전, 복부 및 근육경련, 구토, 발한, 불쾌감, 감각장애 및 불면증)이 이 약을 포함한 벤조디아제핀계 약물의 급격한 중지 후에 나타났습니다. 더 심한 증상은 보통 고용량 및 장기간 사용과 연관되어 있지만, 치료용량에서 1~2주 정도 투여한 환자에게도 금단증상이 나타날 수 있으며, 어떤 경우에는 투여중간에 금단증상(낮 동안의 불안, 격앙)이 나타날 수 있습니다. 그러므로 갑작스런 투여중지를 피해야 하며, 주주 이상 동안 최소용량 이상으로 투여한 경우 점진적인 용량 감소가 필수적입니다.
- 2) 약물 중독 및 알코올 중독 등의 병력이 있는 환자는 습관성 및 의존성 경향이 증가될 수 있으므로 주의합니다.
- 3) 비교적 다루기 힘들고 혼한 이상반응으로 졸음, 어지러움이 나타날 수 있습니다(1% 이상).
- 4) 다음과 같은 이상반응이 자주 보고된 바 있습니다(0.9~0.5%).
 - : 다행증, 빈맥, 피로, 혼돈/기억상실, 경련/통증, 우울증, 시각이상(무시, 동공확대, 안정적으로, 눈부심), 두통, 두중, 일과성 건망(중도 각성 시 주변일을 잊어버립니다.)
- 5) 다음과 같은 이상반응이 드물게 나타났습니다(0.5% 미만).
 - : 변비, 미각이상, 설사, 구갈, 피부염/알레르기, 꿈/악몽, 불면증, 이명, 감각이상, 허약, 울혈, 이뇨제를 투여받은 환자 중 간부전으로 인한 사망, 몽롱상태, 불안, 초조감, 협조운동실조, 불쾌감, 심부부불쾌감, 피하출혈, 심계항진, 흉부압박감, 혈압상승, 혈압강하, 권태감, 혀의 고임, ALT, AST, γ-GTP, ALP 상승
- 6) 발생빈도의 평가가 어려운 이상반응 이외에 이 약 및 다른 벤조디아제핀계 약물사용과 관련하여 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있습니다.
 - : 건망증 증후(적당 또는 부적당한 행동을 수반하는 선행성 건망증), 혼돈상태(방향감각장애, 현실격리증, 이인증 및/또는 의식의 혼탁), 근긴장이상, 식욕부진, 피로, 진정, 언어장애, 황달, 가려움, 식욕변화, 혈당결손, 요실금, 요저류, 알코올 또는 다른 약물과의 병용, 수면탈취, 비정상적인 발병진 상태가 나타날 수 있음

니다. 또한 호흡기능이 고도로 저하된 환자에게 이 약을 투여할 경우에는 탄산가스에 의한 혼수를 일으킬 수 있으므로 이러한 경우에는 기도를 확보하고 환기하는 등 적절한 처치를 합니다.

7) 다음과 같은 역효과가 보고된 바 있습니다.

· 자극, 격앙상태(불안, 자극과민, 흥분), 근육 경련의 증가, 수면장애, 환각, 공격성, 실신, 몽유, 망상, 이상한 행동 및 기타 역행위

8) 또한 다음과 같은 증상이 보고되었습니다 : 가슴쓰림, 설열감, 위염

5. 일반적 주의

1) 수면장애는 신체적 또는 정신적 장애로 나타나는 증상일 수 있습니다. 그러므로 불면의 증상 치료를 개시하기 위한 결정은 환자를 주의 깊게 관찰한 후에 결정해야 합니다.

2) 치료개시 7~10일 이후에도 불면증이 계속되면 일차적으로 정신병이나 다른 질병이 있는 것으로 볼 수 있습니다.

3) 불면증의 악화는 사고나 행동의 새로운 이상조짐은 인식되지 않은 신체적 또는 정신적 장애의 결과일 수 있습니다. 이 약을 포함하여 벤조디아제핀계 수면제의 사용과 관련하여 이러한 이상반응이 나타날 수 있다고 보고된 바 있습니다.

4) 이 약의 이상반응 중 일부는 투여량과 관련이 있는 것으로 보이므로 가능한 최소유효량을 사용하는 것이 중요하며, 고령자인 경우에는 특히 투여량과 관련된 이상반응이 나타나기 쉽습니다.

5) 수면운전과 기타 복합 행동
수면진정제 복용 후 완전히 깨지 않은 채로 침대에서 일어나 운전을 하는 사례가 보고되었으며, 그러한 행동에 대해서는 주로 기억을 하지 못했습니다. 수면운전은 위험할 수 있으므로 발생 즉시 의사에게 알려야 합니다. 이러한 행동은 알코올이나 다른 중추신경억제제와 병용시 발생할 가능성이 증가될 수 있습니다('1. 경고'항 참조). 수면 진정제 복용 후 완전히 깨지 않은 환자에서의 음식준비나 먹기, 전화하기, 심판계와 같은 다른 복합 행동이 보고되었습니다. 수면 운전과 같이 환자들은 이러한 행동을 대체로 기억하지 못합니다.

6) 음주여부와 현재 투여 중인 약물(매약 포함)에 관하여 의사에게 알려주어야 하며, 수면제를 투여 중에는 가급적 음주를 피해야 합니다.

7) 임신할 예정인지, 임신 중인지 또는 이 약 투여 중에 임신하게 되는지 여부를 의사에게 알려야 합니다.

8) 수유 중인지의 여부를 의사에게 알려야 합니다.

9) 환자는 투여중지 후 하루, 이틀만에 수면의 불편(불면증 재발)이 증가할 수 있음을 알려주어야 합니다.

10) 투여 후에 몽롱한 상태가 나타날 수 있습니다. 또한 수면 전 또는 도중 각성 시에 일어난 일을 기억하지 못할 수 있으므로 주의합니다.

11) 불면증에 투여하는 경우에는 장기간 투여를 피하고 단기간 동안만 투여합니다. 부득이하게 계속 투여하는 경우에는 정기적으로 환자의 상태, 증상 등의 이상유무를 충분히 확인한 후 신중히 투여해야 합니다.

12) 비행기 여행과 같은 여행 중 수면을 유도하기 위해 이 약을 투여한 환자에서 '여행자 건강증'이 보고되었습니다. 이들 중 일부는 근무 시작 전 기상 시까지 충분한 수면시간이 허용되지 않았으며 일부는 알코올을 병용사용한 것이 한 요인일 수 있었습니다.

6. 상호작용

1) 다음 약물과의 병용 또는 음주에 의해 이 약의 작용이 증가할 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여할 경우에는 신중히 투여합니다 : 다른 항정신성 의약품, 진경제, 항히스타민제 등의 중추신경억제제

2) 다음 약물과 병용 시 이 약의 대사가 억제되어 반감기 및 혈중 농도가 증가될 수 있으므로 이 약의 농도를 줄이는 등 신중히 투여해야 합니다 : 시메티딘, 클라리트로마이신, 트리아세틸올레안도마이신, 인산올레안도마이신, 딜티아젠프, 에리트로마이신과 같은 매크로라이드계 항생제

3) 이 약은 CYP3A 효소에 의해 대사되며, 동일경로로 대사되는 아졸계 항진균제(케토코나졸, 이트라코나졸, 플루코나졸, 미코나졸)와 병용시 이 약의 대사가 저해되고 대사지연에 의한 혈중 농도의 상승, 작용의 증강 및 작용시간의 연장이 보고되었으므로 병용투여해서는 안됩니다. 또한 동일경로로 대사되는 음식물과도 상호작용을 나타내므로 주의해야 합니다.

4) 리파아제 : 이 약의 대사가 촉진되어 혈중 농도를 저하시키는 사례가 있으므로 주의하여야 합니다.

5) 이소니아지드, 플루복사민, 세트랄린, 파록세틴, 딜티아젠프와 베라파필과의 투여 시는 주의하여야 하고, 경구피임제, 자몽주스와 병용 시 임상적 유의성이 있을 수 있습니다.

6) HIV 프로테아제 저해제(예: 리토나비르)와 트리아졸람과의 상호작용은 복잡하고 시간 의존적입니다. 리토나비르의 작용량은 트리아졸람의 청소율 부전, 반감기를 연장시키고 임상효과를 증가시킵니다. 그러나, 리토나비르에 노출이 지속될 경우 CYP3A 유도자 이러한 저해를 상쇄합니다. 이러한 상호작용은 이 약의 용량감소 또는 투여중지를 요구할 것입니다.

7. 일부 및 수유부에 대한 투여

1) 임신 중 또는 벤조디아제핀계 약물을 투여한 환자에서 기형아 등의 장애아를 출산한 예가 대조군에 비해 유의상있게 높다는 역학조사보고가 있으므로 임부에 투여해서는 안됩니다.

2) 임신 후기에 다른 벤조디아제핀계 약물(디아제팜, 니트라제팜)을 연용한 환자에서 신생아에게 포유곤란, 근긴장저하, 졸음, 황달 증가 등의

증상이 발현되었다는 보고가 있습니다.

3) 분만 전에 연용한 경우에 출산 후 신생아에게 금단증상(신경과민, 진전, 과다긴장 등)이 나타난 것이 다른 벤조디아제핀계 약물(디아제팜)에서 보고되었습니다.

4) 모유 중으로 이행되어 신생아에게 졸음, 체중감소 등을 일으킬이 다른 벤조디아제핀계 약물(디아제팜)에서 보고되었으므로 수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직하며 부득이한 경우에는 수유를 중단합니다.

5) 환자가 이 약을 투여하는 중 임신 가능성이 있다면 태아에 대한 위험성을 알려주어야 하며 임신 전에 투약을 중단하도록 알려주어야 합니다. 가임 여성이 치료를 시작할 때에는 임신 가능성을 고려해야 합니다.

8. 소아에 대한 투여

18세 이하의 소아에 대한 이 약의 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않습니다.

9. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 과도진정, 어지러움, 운동실조 등의 이상반응이 나타나기 쉬우므로 가능하면 저용량에서부터 투여하는 등 신중하게 투여해야 합니다.

10. 과량투여시의 처치

1) 이 약의 효과 때문에 과량투여량은 2mg으로 나타났습니다.

2) 이 약의 과량투여 시 증상은 경련, 혼돈, 조화 불능, 말더듬증 및 혼수상태입니다. 호흡억제 및 무호흡이 이 약의 과량투여에서 보고된 바 있으며, 때때로 발작이 과량투여 후에 보고된 바 있습니다. 다른 벤조디아제핀계 약물에서와 마찬가지로, 스스로 이 약을 과량투여하여 사망한 예가 보고되어 있습니다. 또한 이 약 또는 다른 벤조디아제핀계 약물을 알코올과 병용하여 과량투여한 환자에서도 사망한 예가 보고된 바 있습니다. 이 경우에 가꿈 될 수 있는 알코올 및 벤조디아제핀계 약물의 농도는 단독투여 시 사망하였을 때의 농도보다 낮다고 보고되었습니다.

3) 모든 약물의 과량투여 시와 마찬가지로 호흡, 맥박 및 혈압을 관찰하고, 필요시 통상적인 처치방법을 취해야 합니다. 즉각적인 위세척과 아울러 정맥내 체액을 투여해야 하며 적절한 기도를 유지해 주어야 합니다.

4) 동물실험에서 이 약을 정맥내 대량투여(체중 kg당 100mg 이상, 사람의 1회최대용량 1,000배 이상) 후 심폐허탈이 나타났습니다. 이 증상은 인공양압호흡과 레바르테레올 또는 메타라마일의 정맥내 주입으로 회복될 수 있었습니다. 혈액투석 및 인위적인 이뇨는 과량투여 시 거의 효과가 없는 것으로 나타났습니다.

5) 고령적인 과량투여의 경우 의사는 환자가 여러 약물과 함께 투여했는지도 모른다는 것을 염두에 두어야 합니다.

6) 마우스에 대한 경구용 LD₅₀은 체중 kg당 1,000mg 이상이며, 랫드는 체중 kg당 5,000mg 이상입니다. 마우스에게 인체 용량의 4,000배에 해당하는 이 약을 투여하여 24개월간 관찰했을 때 발암가능성이 나타나지 않았습니까.

7) 이 약을 과량투여한 경우, 또는 과량투여가 의심되는 경우 플루마제닐(벤조디아제핀계 수용체 길항제)로 처치할 때는 사용 전에 반드시 플루마제닐의 사용상의 주의사항('2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.', '3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.', '6. 상호작용'항 참조)을 읽어야 합니다.

11. 기타

투여한 약물이 특별히 정해지지 않은 상태에서 플루마제닐(벤조디아제핀 수용체 길항제)을 투여 받은 환자에게 새로 이 약을 투여할 경우에는 이 약의 진정·항경련 작용이 변화 또는 지연될 수 있습니다.

12. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관합니다.

■ 저장방법 : 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 사용(유효)기간 : 제조일로부터 36개월

■ 포장단위 : 30, 200정

Ⓡ = 등록상표

※ 본 제품은 GMP규정에 따라 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 사용기한의 경과, 변질, 변패, 오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 및 의약품 판매업자를 통하여 교환하여 드립니다.

■ 제품문의처 : 고객상담전화(080-405-1238)

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

복용 시 주의사항 : PTP 포장의 약제는, PTP 은박을 잘못 먹게 되면 은박의 ऐ리한 부분이 식도 점막을 손상시킬 수 있으므로, 약제 사용 시 반드시 PTP 은박을 잘 분리한 후 복용하십시오.

※ 이 첨부문서 개정일자(2015년 8월 18일) 이후 변경된 내용은 www.whanin.com이나 고객상담전화(080-405-1238)에서 확인하십시오.

문인최중개정일자 : 2015. 08. 18

3018099-7

제조판매원



환인제약(주)

경기도 안성시 공단로 50