

진해거담제

목틴[®] 캡슐

(아세틸시스테인)

일반의약품	
의 약 품	222
분류번호	진해거담제

【원료약품의 분량】 1캡슐 중
아세틸시스테인(USP) 200mg
첨가제(타르색소) : 청색 1호, 적색 40호

【성 상】
백색 분말이 충전된 상하 연청색의 경질캡슐제

【효능·효과】
1. 주 효능·효과
1) 다음 질환에서의 객담(가래)배출곤란 : 급·만성기관지염, 기관지확장증, 천식성기관지염, 기관지천식, 세기관지염, 낭성섬유증
2) 인·후두염, 부비강염, 삼출성 및 장액성 중이염

【용법·용량】
아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 경구투여한다. 연령(나이)·증상에 따라 적절히 증감한다.

적응증	성 인	성 인
급성질환	1회 200mg, 1일 3회	소아 6~14세 : 1회 200mg, 1일 2회
만성질환	1회 200mg, 1일 2회	소아 6~14세 : 1회 100mg, 1일 3회
낭성섬유증		소아 6세 이상 : 1회 200mg, 1일 3회 2~5세 : 1회 100mg, 1일 4회

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
1) 이 약에 과민증 환자
2) 위·십이지장궤양 환자
3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
신생아(중증(심한증상) 질환이 아닌 경우, 신생아에게 투여하지 마십시오)



3. 부작용
1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염(입안염), 가슴쓰림, 설사 등이 나타날 수 있습니다.
2) 과민증 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명(귀울림), 기관지경련(특히 천식환자)등이 나타날 수 있습니다.
3) 드물게 빈맥(빠른맥), 고혈압이 나타날수 있습니다.
4. 상호작용
경구용(먹는) 항생물질(아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치암페니콜)과 병용(함께사용)투여시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있습니다. (적어도 2시간의 간격을 두고 투여하십시오.)
5. 임부에 대한 투여
임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우에만 투여하십시오.
6. 수유부에 대한 투여
이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여하십시오.
7. 적용상의 주의
이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피해야 합니다.

【저장방법】
기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】
자사포장단위

【제품문의처】
한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.
(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)
※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※ 주의
1. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2. 정해진 용법·용량을 준수하여 사용할 것.
3. 잘못된 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
4. 충분한 양의 물과 함께 복용할 것.
5. 개봉 후 충전물이 있을 경우 완전히 제거하고 사용하시기 바라며, 개봉 후 뚜껑을 잘 닫아 보관할 것.
(실리카겔(건조제)을 먹지 말 것.)

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 개정연월일 : 2014. 02. 08

Hanmi 한미약품(주)

(본사)서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장)경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.