


일반의약품  
분류번호 : 02220

## 아 세 르 정

(암브록솔염산염)

※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.



일반의약품  
분류번호 : 02220

아세르정은 호흡기계 점막의 보호피막을 형성하는 표면활성물질(Surfactant)의 생성·분비 촉진 작용이 있으며 기관지내의 섬모 운동으로 이물을 기도 밖으로 배출시켜 기관지를 보호해주며, 호흡기에 세균감염 및 각종 공해 흡연 등으로 인한 객담이 농후하게 생성되어 배출되지 않으면 기침이 발생하게 되며, 이러한 분비기능을 활성화시켜 신속한 거담효과를 갖는 이상적으로 처방된 광범위 호흡기질환 치료제입니다.

### ■ 원료약품 및 그 분량 1정 중

주성분 : 암브록솔염산염(BP) ..... 30mg

### ■ 성 상 : 백색의 원형정제

### ■ 약리작용

1. 기도청정기능  
아세르정은 폐포로 흡입된 이물질을 세정효과를 나타내어 섬모계 및 비 섬모계의 활성화로 점액의 배출속도로 증가시켜 기도를 청정하게 해줍니다.
2. 표면활성물질의 분비 및 객담배출 촉진작용  
아세르정은 표면활성 물질의 주성분인 인지질의 합성·분비를 촉진하여 객담의 분비를 저하시켜 섬모운동을 활성화시켜주므로 객담배출을 촉진시킵니다.
3. 부작용저하  
위장관에 대한 부작용이 적고 내성이 우수하므로 장기치료에도 적합합니다.

### ■ 효능·효과

점액분비장애로 인한 다음의 급·만성 호흡기질환 : 급·만성기관지염, 천식성기관지염

### ■ 용법·용량

성인 : 암브록솔염산염으로서 1회 30mg(1정) 1일 3회 복용한다. 계속 치료시 1회 30mg(1정) 1일 2회 복용한다. 이 약은 식사와 관계없이 복용할 수 있다.

### ■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
  - 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
  - 2) 심한 신장에 환자
  - 3) 심한 간장애 환자
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
  - 1) 신장에 환자
  - 2) 소화성 궤양 환자
  - 3) 임부 : 이 약은 태반장벽을 통과한다. 비임상시험 뿐만 아니라 임신 28주후의 임상 경험에서도 임신중에 약영향의 증거는 보이지 않았으나 이 약은 임신중에 투여가 권장되지 않는다(특히, 임신 초기 3개월 이내에는 투여하지 않는다).



삼남제약(주)

KGMP공장 : 충청남도 금산군 금산읍 인성로 77  
소비자 상담창구 : 041-754-3771

4) 수유부 : 이 약은 모유로 이행하므로 수유부에게 투여하는 것은 권장되지 않는다.

5) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
  - 1) 이 약과 같은 점액용해제 복용과 관련하여 피부점막안중후군(스티븐스-존슨 증후군), 독성표피괴사용해(리엘증후군) 같은 심각한 피부 손상이 매우 드물게 보고되었다. 대부분 환자가 가지고 있는 기저질환의 중증도 및/또는 병용(함께복용) 약제에 의해 설명될 수 있었다. 피부점막안중후군(스티븐스-존슨 증후군) 또는 독성표피괴사용해(리엘증후군)의 초기 단계에 열, 가려움, 비염, 기침 및 인후염과 같은 비특이적 인플루엔자-유사 전구증상이 나타날 수 있다. 비특이적 인플루엔자-유사 전구증상으로 인해 잘못 판단하여 기침 및 감기 치료제를 투약하여 증상 치료를 시작할 가능성이 있다. 따라서 이 약 복용 중 새로운 피부 또는 점막 손상이 나타나면 즉시 복용을 중지하고 전문가의 상담을 받아야 한다.
  - 2) 소화기계 : 흔하게 구역, 흔하지 않게 구토, 설사, 소화불량, 복통, 가슴쓰림, 구강건조를 포함하는 경미한 상부 위장관계 이상반응, 드물게 위부불쾌감, 위·복부팽만감, 변비, 식욕부진 등이 나타날 수 있다.
  - 3) 면역계, 피부 및 피하조직 : 드물게 두드러기, 피부 발진이 보고되었으며, 아나필락시스 반응(아나필락시스 쇼크 포함), 두드러기모양 홍반(붉은반점), 혈관부종(혈관부기), 가려움, 기타 다른 과민반응, 얼굴부기, 호흡곤란, 오한(춥고 떨리는 증상)을 수반한 체온상승 등이 나타날 수 있다.
  - 4) 호흡기계 : 백혈구 증가를 수반하는 화농성 비염이 나타날 수 있다.
  - 5) 신경계 : 흔하지 않게 허의 감각이상, 미각변화가 보고되었으며, 드물게 구내마비감, 팔의 마비감 등이 나타날 수 있다.
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
  - 1) 에리트로마이신, 세팔렉신, 옥시테트라사이클린, 아목시실린, 세퓨록심, 독시사이클린 등의 항생물질과 함께 복용시 기관지폐분비물과 가래에서 항생물질의 농도를 증가시킨다.
  - 2) 사람에서 과량투여와 관련된 특이적인 증상은 보고된 바 없다. 우발적인 과량투여나 투여 오류로 인하여 보고된 증상들은 이 약을 1일 상용량으로 투여하였을 때 보고된 이상반응과 유사하였다. 과량투여에 의한 증상 치료는 대증요법(증상별로 치료하는 방법)을 실시한다.
  - 3) 시판 후 자료에서 운전 및 기계조작에 대한 영향의 증거는 없었다. 운전 및 기계조작에 대한 영향에 대하여 연구된 바 없다.
5. 저장상의 주의사항
  - 1) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
  - 2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 무광을 꼭 닫아 보관할 것.
  - 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관할 것.

■ 포장단위 : 1000정/병

■ 사용기한 : 외부포장에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

- ※ 이 문안은 2016년 09월 28일자로 작성되었으며 변경된 내용은 [www.samnam51.com](http://www.samnam51.com)이나 041-754-3771에서 확인할 수 있음.  
※ 만약 유통과정 중 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 의약품은 약국·병원 개설자에 한하여 본사 또는 영업소를 통해 교환하여 드립니다.  
※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.