

급 · 만성간질환치료제

펜넬 캡슐


전문의약품

분류번호 : 391

급 · 만성간질환치료제

펜넬 캡슐

【원료약품분량】 1캡슐 중

마늘유	(KHP)	50.0mg
(알리신으로서 0.05mg)		
비페닐디메틸디카르복실레이트	(별규)	25.0mg
유당수화물	(KP)	기원:동물유래(건강한 소의 우유)

【성 상】

백색-옅은 황색의 분말이 든 상부 갈색, 하부 적색의 캡슐제

【효능 · 효과】

트랜스아미나제가 상승된 급 · 만성 간염

【용법 · 용량】

1회 1 ~ 2캡슐, 1일 3회 식후 복용

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에게는 투여하지 말 것
이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음환자에는 신중히 투여할 것.
1) 만성 활동성 간염 환자
2) 간경변 환자
3) 이 약은 황색 5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 이상반응
1) 입안마름, 메스꺼움, 피부발진이 일어날 수 있으며, 이러한 이상반응은 항과민약을 병용투여하면 소실된다.
2) 일과성 황달이 나타날 경우도 있으나 투약을 중지하거나 황달 치료제를 병용 투여하면 소실된다.
3) 드물게 구역과 복부팽만이 발생할 수도 있으나 곧 소실된다.
4) 국내 시판후 조사결과
국내에서 6년 동안 843명을 대상으로 실시한 시판후 조사 결과 추가로 나타난 이상반응은 다음과 같으며 약과의 인과관계는 확실하지 않다: 부종(2명)
- 상호작용
이노신(Inosine)과 함께 투여시, 재발한 ALT의 상승이 개선될 수 있다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
임부 및 수유부에는 투여하지 않는다.
- 소아에 대한 투여
소아에는 용량을 감소시켜 투여한다.
- 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 신중히 투여한다.

8. 임상 검사치에의 영향

치료 중에 다시 ALT가 상승하는 환자는 거의 없다. 투여 중지 후에 ALT는 증가할 수 있으나 이약의 재투여로 개선된다.

9. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

【포장단위】 자사포장단위 (30C, 90C, 100C, 500C)

【저장방법 및 사용기간】

기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

- ※ 의약품을 사용하시기 전에 본 설명서를 주의깊게 읽어주시기 바라며, 설명서는 반드시 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 만일 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 때는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 자세한 내용은 자사로 문의하시길 바랍니다.
(소비자 상담실: 02-6925-4064)
- ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 설명서 (재)작성일 이후 변경된 내용은 자사 홈페이지(<http://www.pharmaking.co.kr>)에서 확인 하실 수 있습니다.

(재)작성일 : 2015. 06. 01