

레보투스® 시럽

(레보드로프로핀 0.6%)

- * 이 약을 사용하기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.
- * 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
- * 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

레보드로프로핀(EP).....	600mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP).....	80mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필(KP).....	20mg

[성 상]

불투명 알루미늄 호일에 든 딸기향이 첨가된 무색의 액제이다.

[특 징]

1. 레보투스 시럽은 코데인과 유사한 진해작용을 나타내는 효과가 우수한 제제입니다.
2. 레보투스 시럽은 말초작용성으로 졸음 등의 중추부작용이 없고, 비마약성인 안전한 제제입니다.
3. 흡연 등에 의한 기도과민성 기침이나 바이러스성 기침에도 효과적입니다.

[효능·효과]

기침 : 급·만성 기관지염

[용법·용량]

성인 : 1회 약 10mL, 1일 3회
 소아 : 10 ~ 20kg 1회 약 3mL, 1일 3회
 20 ~ 30kg 1회 약 5mL, 1일 3회
 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 사용하지 말 것.
 이 약에 과민증이 있는 환자
2. 다음의 환자에는 신중히 투여할 것.
 1) 24개월 미만의 유아
 2) 심각한 신부전 환자
3. 부작용
 1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토

- 2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 현기증
- 3) 순환기계 : 두근거림
- 4) 피부 : 아주 드물게 알러지 반응이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작시 주의할 것.
5. 임부 및 수유부예의 사용
임부 및 임신가능자, 수유부에는 투여하지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10mL

- * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- * 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 발적, 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의 하십시오.
- * 오용을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.
- * 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- * 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.
- * 이 사용설명서 개정년월(2009년 9월) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처(☎ 080-024-5525)에서 확인할 수 있습니다.

제조외의자 : 현대약품주식회사
충청남도 천안시 동세면 남관리 200
제조사 : 한국콜마주식회사
충청남도 연기군 전의면 신정리 618-3

♣ **제품문의처 :** ☎ 080-024-5525
사용설명서 개정년월 : 2009. 09

 **현대약품(주)**



Under license of
Dompé International S.A., Switzerland