

부교감 신경차단제 대한 아트로핀황산염 주사액

KGMP적격업체

전문 의약품

(피하·근주·정주)

제조원
대한약품공업주식회사
공장: 경기도 안산시 단원구 원시동 736-1

1mL × 50A



전용 1mL, 1V, S-C 0.5mg/1mL
아트로핀황산염주
DAI HAN PHARM. CO., LTD.

1mL × 50A
Cholinergic blocking agents
ATROPINE SULFATE inj.



저 장 방 법 : 차광밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

제 조 번 호 : 73K6A52
사 용 기 한 : 14.6.15

대한약품공업(주)

Cholinergic blocking agents

**ATROPINE
SULFATE**
inj

MANUFACTURED BY
DAI HAN PHARM. CO., LTD.
SEOUL · KOREA

1mL × 50A



1mL × 50A
부교감 신경 차단제
아트로핀황산염 주사액
(ATROPINE SULFATE inj.)

*본 제품은 의약품이므로 반드시 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하고 제품에 첨부된 설명서의 안내를 준수해야 합니다.
*올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하십시오.
*연락처
본 제품에 관하여 궁금한 점이 있으시면 아래의 연락처로 연락하여 주십시오.
주소: 서울특별시 영등포구 양평동4가 8-3
대한약품공업주식회사 학술부
전화: 소비자보호팀(수신자요금부담) 080-258-3900

대한약품공업(주)

<대한 아트로핀황산염 주사액 제품설명서>

【원료약품의 분량】 1ml 중

아트로핀황산염수화물(K.P.) 0.5mg
주사용수(K.P.)

【성상】 무색투명한 액을 앰플에 충전한 것.

【효능·효과】

위장관의 경련성 동통, 담관·요관의 산통, 경련성 변비, 위·십이지장궤양에서의 분비 및 운동 항진, 방실전도장애, 미주신경성 석핵, 마취전투약, 유기인 살충제·부교감신경흥분제 중독.

【용법·용량】

• 성인

1. 아트로핀황산염수화물로서 1회 0.5mg을 피하 또는 근육주사한다. 경우에 따라 정맥주사 할 수 있다.
2. 유기인 살충제 중독.
 - 1) 경증: 아트로핀황산염수화물로서 0.5~1mg을 피하주사한다.
 - 2) 중등증: 이 약으로서 1~2mg을 피하 또는 근육주사하고 필요시 20~30분 간격으로 반복 주사한다.
 - 3) 중증: 이 약으로서 2~4mg을 정맥주사하고 증상에 따라 아트로핀의 포화정후가 나타날 때까지 반복주사한다.

* 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 녹내장 환자
- 2) 전립선비대에 의한 배뇨장애 환자
- 3) 마비성 장폐쇄 환자
- 4) 이 약에 과민증 환자
- 5) 천식 환자

3. 다음의 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 전립선비대 환자
- 2) 울혈성 심부전 등 중증의 심질환 환자
- 3) 폐양성 대장염 환자
- 4) 감상선기능항진증 환자
- 5) 고온 환경에 있는 자
- 6) 40세 이상의 환자

4. 부작용

- 1) 눈: 동공확대, 조절장애, 녹내장, 시야몽롱 등이 나타날 수 있다.

2) 정신신경계: 두통, 두중, 기면(記銘)장애, 어지러움 등이 나타날 수 있다.

3) 소화기계: 구갈, 구역, 구토, 삼킴곤란, 변비 등이 나타날 수 있다.

4) 호흡·순환기계: 심계항진, 호흡장애 등이 나타날 수 있다.

5) 과민증: 발진 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다. 속, 아나필락시양 증상이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고, 빈맥, 전신홍조, 발한, 안면부종 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고, 적절한 처치를 한다.

6) 비뇨기계: 배뇨장애가 나타날 수 있다.

7) 기타: 안면홍조가 나타날 수 있다.

8. 일반적 주의

시조절장애, 동공확대 등이 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계 조작을 하지 않도록 주의한다.

6. 상호작용

- 1) 페노치아진계 약물, 삼환계 항우울약, 항히스타민제, 이소니아지드 등 항콜린 작용을 가지는 약물과 병용시 이 약의 작용이 증강될 수 있다.
- 2) MAO 저해제와 병용시 항콜린 작용이 증강될 수 있다.
- 3) 강심배당체(디곡신 등)와 병용시 강심배당체의 독성이 증강될 수 있으므로 신중히 투여한다.
- 4) 합성콜린에스테르, 항콜린에스테라제, 콜린양 작용의 알콜로이드와 이 약은 길항한다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 태아에 빈맥 등이 나타날 수 있으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 2) 신생아에 빈맥 등이 나타날 수 있으므로 수유중의 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직하다. 또한 유즙분비가 억제될 수 있다.

8. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 없다.).

9. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에는 항콜린 작용에 의한 녹내장, 기명장애, 구갈, 배뇨곤란, 변비 등이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여한다.

10. 적응상의 주의

피하·근육주사시 동물실험(토끼)에서 출혈, 출혈, 변성 등의 국소장애가 나타났으므로 피하 또는 근육주사시 조직·신경 등에 영향을 주지 않도록 주의한다.

【저장방법】 차광밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

【포장】 1mL × 1, 10, 20, 50Amp, 20mL × 1, 10, 20, 50Amp.

☆사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손되었을 때에는 약국, 도매상, 병의원 등의 개설자에 한하여 구입처에서 신중으로 교환해 드립니다.

최종개정년월일 2008. 2. 29