

■ **원료약품의 분량** : 1정(800.0 mg) 중
 • 유효성분 : 아세트산칼슘(USP) ... 710.0 mg (무수물로서 667.0 mg)
 • 첨가제 : 경질무수구산, 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 히드록시프로필셀룰로오스

■ **성 상** : 백색의 장방형 정제
 ■ **약리작용 및 특징**
 ① 포스포정(아세트산칼슘)은 말기 신부전환자의 고인산 혈증에 처방되는 강력한 인산결합제입니다. ② 포스포정의 아세트산칼슘 제제는 미국 FDA에서 안전성과 유효성이 입증된 제제입니다. ③ 다른 칼슘제제와 비교시 산, 알칼리에 관계없이 약 100,000배 이상의 용해도를 나타내고 인산결합력도 3배이상 뛰어나 체내 이용율이 매우 우수합니다.(유효성) ④ 고칼슘혈증과 같은 부작용 발현율이 극히 낮습니다.(안전성)
 ■ **효능 · 효과** : 말기 신부전 환자의 고인산혈증
 ■ **용법 · 용량** 1) 초기 용량 : 매 식사 중 2정씩 경구로 복용하십시오. 2) 유지 용량 : 고칼슘혈증을 유발하지 않는 상태에서 혈중인산의 농도가 6mg/dl이하가 될 때까지 용량을 점차 증가시킵니다. 통상, 식사중 3~4정을 경구로 복용하십시오.

■ **사용상의 주의사항**
 1. 다음 환자에게는 투여하지 말 것 : 고칼슘혈증 환자
 2. 부작용 : 고칼슘혈증을 유발할 수 있으며, 경증(가벼운 증상)의 고칼슘혈증($Ca > 10.5mg/dl$)은 무증상이거나 변비, 식욕부진, 오심(구역), 구토를 일으킬 수 있으며, 중증(심한 증상)은 착란, 지각 탈실, 혼수 등을 일으킬 수 있다. 경증(가벼운 증상)일 경우는 복용량을 줄이거나 사용을 중지



하고 중증(심한 증상)일 경우는 복용을 중지하고 혈액투석을 실시한다.
 3. **일반적 주의**
 1) 이 약의 복용량은 초기에 결정하여 필요에 따라 조정한다. 2) 이 약의 과량 투여는 고칼슘혈증을 유발할 수 있으므로 용량을 결정하는 치료초기단계에 혈중 칼슘농도를 1주일에 2번씩 측정한다. 3) 고칼슘혈증은 심부정맥을 촉진할 수 있기 때문에 디기탈리스를 투여하는 환자에게는 이 약을 투여하지 않는다. 4) 혈중 인산농도는 정기적으로 측정하여야 한다. 5) 비처방된 제산제의 복용을 피한다. 6) 인산과 결합된 혈중칼슘은 66을 넘지 않아야 한다.
 4. **상호작용** : 이 약은 테트라사이클린의 생물학적 활성을 낮출 수 있다.
 5. **임부 및 소아에 대한 투여**
 1) 이 약을 투여하여 실시한 동물시험에서는 최기형성(기형유발성)이 나타나지 않았으나, 임부에 투여할 경우에는 유익성이 위험성을 상회(웃돌)할 경우에만 투여한다. 2) 소아에 대한 안전성과 유효성은 확립되어 있지 않다.
 6. **기타** : 고칼슘혈증의 증상을 환자에게 인지시켜 주의하도록 한다.

■ **저장방법 및 사용기간** : 기밀용기, 실온보관, 제조일로부터 24개월
 * 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. (구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 첨부문서 개정연월 : 2019. 02

■ **제조번호, 사용기한** : 중앙표기