

발트렉스TM 정 500밀리그램

(염산발라사클로버) 전문의약품

■원료약품 및 분량: 1정(696mg) 중
주성분: 염산발라사클로버(별규)

556.00mg
(발라사클로버로서 500mg)

■성상: 흰색의 양면이 볼록한 정방형 필름코팅정

■효능·효과

1. 대상포진 및 이로 인한 통증의 치료
2. 초발 및 재발성 성기포진 감염증의 치료
3. 성기포진 감염증의 재발 억제
4. 안전한 성생활을 병행하는 경우 억제요법으로서 성기포진의 전염 감소
5. 신장이상 후 거대세포바이러스 감염 예방
6. 구순포진
7. 면역기능이 정상인 2세 이상 소아의 수두 치료

■용법·용량

1. 성인

- 1) 대상포진 치료
1회 1000mg씩, 1일 3회, 7일간 투여한다.
 - 2) 성기포진 감염증의 치료
1회 500mg씩, 1일 2회 투여한다. 재발성인 경우에는 5일간 투여하고, 초발인 경우 증상이 심하면 10일까지 투여할 수 있다. 치료는 가능한 빨리 시작하는 것이 좋다. 재발성 단순포진의 경우, 전 구증상 또는 증상/징후가 최초로 나타나자마자 투여하는 것이 가장 효과적이다. 이 약은 재발성 성기포진의 증상/징후가 최초로 나타났을 때 투여하면 병소 악화를 방지할 수 있다.
 - 3) 성기포진 감염증의 재발 억제
- 면역기능 정상 환자: 1일 총 투여량은 500mg이고, 1회 250mg씩, 1일 2회 투여할 수 있다. 1회 500mg씩, 1일 1회 투여 역시 효과적이며, 특히 연간 10회 미만으로 재발하는 환자의 경우에는 효과적이다.
- 면역기능 저하 환자: 1회 500mg씩, 1일 2회 투여한다.
 - 4) 성기포진의 전염 감소
연간 9회 이하로 재발하는 면역기능 정상인 이성애(異性愛) 성인의 경우: 감염된 성 파트너는 Herpes Simplex Virus-2 (HSV-2) 항체가 음성인 성적 파트너에게 전염을 감소시키기 위해 1회 500mg씩, 1일 1회 복용하여야 한다. 안전한 성생활(특별히 콘돔을 사용)이 유지되어야 하고, 병소가 나타났을 경우에는 성적 접촉을 피해야 한다.
 - 5) 거대세포바이러스 감염의 예방(12세 이상)
1회 2000mg씩, 1일 4회 복용하고, 이식 후 72시간 내에 혹은 복용이 가능하자마자 투여를 시작한다. 투여량은 크레아티닌 청소율에 따라 감소시켜야 한다. 투여기간은 대개 90일이다.
 - 6) 구순포진
구순포진 치료를 위한 이 약의 권장용량은 1회 2000mg씩, 1일 2회 12시간 간격으로 1일간 투여하며, 구순포진의 초기 징후(예: 저림, 가려움, 화끈거림)가 나타나자마자 투여를 실시해야 한다. 구순포진의 임상증상(예: 구진, 소포진, 궤양)이 나타난 이후 이 약을 투여했을 때의 유효성은 확인되지 않았다.
2. 소아
- 1) 구순포진(12세 이상)
구순포진 치료를 위한 이 약의 권장용량은 1회 2000mg씩, 1일 2회 12시간 간격으로 1일간 투여하며, 구순포진의 초기 징후(예: 저림, 가려움, 화끈거림)가 나타나자마자 투여를 실시해야 한다. 구순포진의 임상증상(예: 구진, 소포진, 궤양)이 나타난 이후 이 약을 투여했을 때의 유효성은 확인되지 않았다.
 - 2) 2세 이상 소아의 수두치료: 1회 20mg/kg씩, 1일 3회 5일간 투여하며, 총 용량이 1회 1000mg, 1일 3회를 초과해서는 안 된다. 초기 징후나 증상이 나타나자마자 치료를 시작해야 한다. 경구용 아시클로버의 임상시험의 유효성 자료에 따라, 발진이 시작된 후 24시간 이내에 투여를 시작해야 한다.
3. 고령자
신기능이 특별히 손상된 경우를 제외하고는 투여량 조절은 필요하지 않다. 적절한 수분 섭취가 유지되어야 한다.
4. 신기능 장애 환자
- 1) 대상포진 치료, 성기포진 치료, 예방 및 전염 감소: 유의성 있게 신기능이 손상된 성인 환자는 다음과 같이 투여량을 조절해야 한다.

적응증	크레아티닌 청소율(mL/min)	투여량
대상포진	15~30 15미만	1회 1000mg씩, 1일 2회 1회 1000mg씩, 1일 1회
성기포진치료	15미만	1회 500mg씩, 1일 1회
성기포진 억제 - 면역기능정상 - 면역기능저하 - 성기포진전염 감소	15미만 15미만 15미만	1회 250mg씩, 1일 1회 1회 500mg씩, 1일 1회 1회 250mg씩, 1일 1회

크레아티닌 청소율이 50mL/min/1.73m² 미만인 소아 환자에서는 이 약의 투여에 대한 자료는 없다.
혈액투석 환자의 경우 크레아티닌 청소율이 15mL/min 미만일 경우의 투여량을 따르되 혈액투석이 끝난 후에 투여한다.

2) 거대세포바이러스 예방: 신기능장애 환자는 다음과 같이 투여량을 조절해야 한다.

크레아티닌 청소율 mL/min	투여량
75이상	1회 2000mg씩, 1일 4회
50이상 75미만	1회 1500mg씩, 1일 4회
25이상 50미만	1회 1500mg씩, 1일 3회
10이상 25미만	1회 1500mg씩, 1일 2회
10미만 또는 투석사*	1회 1500mg씩, 1일 1회

* 혈액투석 환자에 대해서는 혈액투석이 끝난 후에 투여한다.

크레아티닌 청소율을 자주 모니터링 해야 하며 투여량을 조절해야 한다. 특히 이식 후 처음 10일 간은 최하의 투여량으로 조절하기 위하여 크레아티닌 청소율을 매일 모니터링할 것이 권장되며 입원기간에는 최소 주당 2회 그 이후에는 필요에 따라서 모니터링이 권장된다.

3) 구순포진

크레아티닌 청소율 mL/min	투여량
30이상 49미만	1회 1000mg씩, 1일 2회
10이상 30미만	1회 500mg씩, 1일 2회
10미만	1회 500mg씩, 1일 1회

■사용상의 주의사항

1. 경고

전환성 HIV환자, 동종이인자형 골수 및 산장이식환자에게 이 약을 1일 8g 이상 투여시 경우에 따라 사망에 이르게 할 수도 있는 혈전성, 갑상선 자반증/응혈성 요독증의 증상(Thrombotic thrombocytopenic purpura/hemolytic uremic syndrome: TTP/HUS)이 유발될 수 있다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 발라사클로버, 아시클로버(발라사클로버의 활성대체) 또는 이 약의 구성성분에 과민증 환자
- 2) 이 약은 용량을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.(유당 함유제에 한함)

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 말수증의 우려가 있는 환자(특히 고령자): 수분을 적절히 공급하는 등 주의하여 투여한다.
- 2) 신기능 장애 환자: 아시클로버는 신장을 통해 배설되므로 신기능 장애 환자에서 이 약의 용량을 감소시켜야 한다. 고령 환자의 경우 신기능이 저하되어 있을 수 있으므로 용량 감소를 필요하지 검토하여야 한다. 고령 환자 및 신기능 장애 환자는 모두 신기능 이상반응이 나타날 위험이 증가되어 있기 때문에 이러한 영향이 나타나는지 주의깊게 모니터링 하아야 한다. 보고된 경우에 있어서 이러한 이상반응은 이 약을 중단함에 따라 일반적으로 회복가능하였다.
- 3) 간기능 장애 및 간이상 환자: 간질환 환자에게 이 약의 고용량(거대세포바이러스 예방 목적) 투여에 대해 유용한 자료가 없다. 중등증~중증 간경화 환자에게 이 약 1g을 투여하였을 때 아시클로버의 AUC가 증가하였다. 따라서 간기능 장애 환자에게 이 약을 고용량으로 투여할 때는 주의하여야 한다.
- 4) 성기 포진 환자: 이 약의 예방적 사용은 성기포진 전염의 위험을 감소시키지만 예방적 사용이 성기포진을 치료하거나 전염의 위험을 완전히 제거하지는 못한다. 이 약 투여와 함께 안전한 성생활이 권장된다(특히, 콘돔 사용).
- 5) 수유부
4. 이상반응
이상반응을 MedDRA(Medical Dictionary for Regulatory Activity)의 신체기관 별 분류 및 발생률에 따라 기술하였으며, 그 발생률은 다음 기준에 따라 기술하였다. : 매우 흔하게: 10% 이상, 흔하게: 1% 이상~10% 미만, 때때로: 0.1% 이상~1% 미만, 드물게: 0.01% 이상~0.1% 미만, 매우 드물게: 0.01% 미만
- 1) 소화기계: 흔하게 구역, 드물게 복부불쾌감, 구토, 설사가 나타날 수 있다.
- 2) 혈액: 매우 드물게 혈소판감소증이 나타날 수 있다.
- 3) 피부, 과민반응: 때때로 광과민을 포함하는 발진, 드물게 가려움, 매우 드물게 두드러기, 맥관부종, 때때로 홍혈관, 매우 드물게 아나필락시스가 나타날 수 있다.
- 4) 신장: 신장: 신장에 의해, 매우 드물게 급성신부전, 신장염(신부전)과 연관이 있을 수 있음이 나타날 수 있다. 세노곤 내역에서 아시클로버의 용해도(2.5mg/mL)를 초과하면 신세뇨관에 아시클로버가 침전될 수 있으므로 모든 환자에게 수분이 충분히 공급되어야 한다. 급성 신부전과 무뇨증이 발생하면, 신기능이 회복될 때까지 혈액투석을 하는 것이 좋다.
- 5) 간장: 매우 드물게 간기능 검사치의 가역적인 상승이 나타나 간염으로 오인될 수 있다.
- 6) 정신신경계: 흔하게 두통, 드물게 어지러움, 혼돈, 환각, 의식저하, 매우 드물게 전전, 조현상동등증, 말더듬증, 경련, 뇌병증, 혼수와 같은 신경계 반응이 나타날 수 있다. 이들 이상반응은 가역적이거나 이러한 반응에 후속하거나 신장에 환자에서 주로 나타났다. 거대세포바이러스 예방 목적으로 이 약을 고용량(매일 8g) 투여받고 있는 신장이상 환자에서 다른 적응증으로 이 약을 처방함으로써 나타나는 환자에서 비하여 정신신경계 반응(혼돈, 환각, 사고장애)이 더 자주 나타났다. 이들은 본래 주로 경증 내지 중등증이며, 종종 조절에 따라 가역적이며, 이식 직후에 주로 나타났다. 따라서 이러한 환자들에 경우에 크레아티닌 청소율을 자주 모니터링 하는 것과 적절하게 용량을 조절하는 것이 중요하다. 이러한 이상반응은 아시클로버에 대한 과잉노출, 신기능 장애, 투석, 정신신경계 약물 복용, 내재하는 약학적 상태를 포함한 다각적인 원인에 기인한 것으로 보인다.
- 7) 기타: 설골부종, 경련, 다형홍반의 이상반응이 보고되었고, 임상시험에서 고용량(1일 8g)의 이 약을 투여받은, 특히 중증의 면역장애가 있는 HIV 질환자에서 신부전, 미세혈관병성응혈성빈혈, 혈소판감소증이 단독으로 또는 병행해서 나타났다는 보고가 있으나, 이러한 이상반응은 같은 질환 상태의 환자로서 이 약을 투여받지 않은 환자에서도 관찰되었다. 면역기능 정상환자에서 재발성 성기포진 감염의 재발 억제를 위한 임상시험에서, 이 약을 1회 1g씩, 1일 1회(n=269) 또는 1회 500mg씩, 1일 1회(n=266) 투여 받거나 위약(n=134)을 투여 받은 환자에서 혈장총(8%, 5%, 4%), 우로중(7%, 5%, 5%), 관혈총(8%, 5%, 4%), 헤파총(4%, 2%, 1%)이 나타났다. 성기포진 감염 감소를 위한 임상시험에서, 이 약을 1회 500mg씩, 1일 1회(n=743) 투여 받거나 위약(n=741)을 투여 받은 환자에서 코인두(16%, 15%) 및 상기도감염(9%, 10%)이 관찰되었다.
- 8) 소아: 이 약의 안전성 프로파일은 1개월 이상 18세 미만의 17명의 소아환자에서 연구되었다. 임상적 이상반응의 빈도, 강도, 특성과 실험실적 수치의 이상은 성인에서 나타난 것과 유사했다.

- ① 12세 이상 18세 미만의 소아환자 (구순포진): 구순포진 치료에 대한 임상시험에서, 하루 동안 이 약 2g을 1일 2회 투여받거나 하루 동안 이 약을 1회 2g씩, 1일 2회 투여 받은 후 다시 하루 동안 1회 1g씩, 1일 2회(n=65, 모든 약을 투여) 투여 또는 위약(n=30)을 투여 받은 청소년 환자에서 보고된 이상반응은 각각 두통(17%, 3%)과 구역(8%, 0%)을 포함한다.
- ② 1개월-12세 미만 소아환자: 3가지 약동학 및 안전성 시험 모두에서 한 명 이상의 소아 환자로부터 보고된 이상반응은 설사(5%), 발열(4%), 탈수(2%), 단순소진(2%), 콧물(rhinorrhea: 2%) 등이다. 임상적으로 의미있는 실험실적 수치 변화는 없었다.
- 9) 시판 후 추가로 나타난 이상반응은 다음과 같다.
- ① 전신: 열감부종, 고혈압, 빈맥
 - ② 정신신경계: 공격적 행동, 초조, 조화운동불능, 혼수, 혼돈, 말대동증, 뇌병증, 조증, 망상, 착란, 마비, 의식간소, 환청, 환시, 발작, 진전을 포함한 정신병
 - ③ 눈: 시각이상
 - ④ 간 및 담도계: 간염, 황달, 간기능 장애
 - ⑤ 신장: 크레아티닌 증가
 - ⑥ 혈액: 재생불량성빈혈, 핵혈구과색성혈관염, 빈혈구간소증, 무과립구증, 파중성혈관내응고증후군, 혈소판감소성자반병
 - ⑦ 피부: 다형성 홍반, 발진, 중증성표피괴사증(열열증후군), 피부점막안염증후군(스티븐스-존슨증후군)
 - ⑧ 폐: 간질성 폐렴
 - ⑨ 소화기계: 급성췌장염
- 10) 국내에서 4년 동안 629명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과 새롭게 보고된 알려지지 않은 이상반응은 다음과 같다.: BUN 증가, 소화불량증, 팔작질
5. 일반적인 주의사항
- 1) 약의 투여는 발병초기에 가장효율적 효과를 기대할 수 있으므로, 빠른 시기에 투여를 시작하는 것이 바람직하다.
 - 2) 대상포진: 대상포진 발병 72시간 이후 치료에 대한 정보는 없다. 이 약을 7일간 사용하고 개선의 조짐이 없거나 혹은 악화될 경우는 치료를 중단하고 다른 치료법을 시작한다.
 - 3) 성기포진: 성기포진 증상발병 72시간 이후 또는 성기포진 재발 증상발병 24시간 이후 이 약의 유효성 자료는 없다. 초기 성기포진에 이 약을 10일간 사용하고 개선의 조짐이 없거나 혹은 악화될 경우는 치료를 중단하고 다른 치료법을 시작한다.
 - 4) 구순포진: 가능한 구순포진의 초기 징후(가려움, 따끈거림) 발현시에 이 약 투여를 시작하도록 환자에게 조언해야 한다. 구순포진의 임상증상(구진, 소포, 궤양)이 발현된 이후 이 약 투여를 시작했을 때의 유효성에 대한 자료는 없다. 구순포진 치료를 위한 이 약의 투여는 1일(2회 투여)을 넘지 않아야 하고 투여간격은 약 12시간 정도임을 환자에게 설명해야 한다. 또한 이 약이 구순포진의 위험을 완전히 제거하지는 못함을 환자에게 설명해야 한다.
6. 상호작용
- 임상적으로 유의성 있는 약물상호작용은 확인된 바 없다.
- 1) 아시클로버는 주로 신세노관 농도분배에 의해 대사되지 않은 상태로 노로 배설된다. 이 약 투여시, 아시클로버와 상경적으로 배설되는 약물을 동시에 투여하면 혈장 중의 아시클로버 농도를 증가시킬 수 있다. 이 약 1g 투여시, 시메티딘과 프로메타이드는 아시클로버의 신장소유를 감소시켜 아시클로버의 AUC를 증가시키나, 아시클로버의 치료자수가 크므로 따로 투여용량을 조정할 필요는 없다. 이 약을 고용량 투여할 경우, 과도한 위산 분비 조절과 노랄 감소 치료를 위하여, 주로 신장을 통해 배설되는 다른 약물들과 상호작용을 일으키지 않는 대체약물을 고려할 수 있다.
 - 2) 이 약 고용량(4g/일 이상)을 투여하는 환자의 경우, 아시클로버와 상경적으로 배설되는 약물을 동시에 투여하는 동안에는 이들 약물 또는 이들 약물의 대사물의 혈장중 농도가 증가할 수 있으므로 주의해야 한다. 이차 환자에게 사용되는 면역억제제인 마이코페놀레이트 모페틸을 병용투여할 경우 아시클로버와 마이코페놀레이트 모페틸의 비활성대사체의 혈장 AUC가 증가된 것이 발견되었다. 이러한 병용투여에 관한 임상시험은 제한적이다.
 - 3) 이 약을 고용량(4g/일 이상) 투여하면서 신장기능에 영향을 주는 약물(시클로스포린, 타크로리무스)을 병용투여할 경우 신기능 변화를 모니터링하는 등 주의해야 한다.
 - 4) 이 약의 활성대사물인 아시클로버와 테오필린의 병용에 의해 테오필린의 중독증상이 나타날 수 있다.
7. 임부 및 수유부에 대한 투여
- 임부에 대한 투여: 임신 중 사용에 대한 자료는 제한되어 있으므로, 치료상의 유익성이 위험성을 상회할 경우에만 투여한다. 임부에 대한 영향 연구 결과에서, 이 약에 노출된 111명(임신 첫 3개월 동안은 29명)과 아시클로버에 노출된 1,246명(임신 첫 3개월 동안은 756명)의 임부에서의 출생위해율은 일반 인구에서의 출생위해율보다 증가하지 않았고, 보고된 위험들은 공통적인 원인에 의한 특이적 위험을 보이지 않았다. 적은 수의 여성에서의 임부에 대한 영향 연구 결과로부터, 이 약의 임부에 대한 안전성에 관한 신뢰할 만한 결론을 낼 수는 없었다. 임신 후기에 매달 이 약 1,000mg 또는 아시클로버 1,200mg을 경구 투여한 약동학 시험에서 이 약의 혈장상태에서 아시클로버의 AUC는 아시클로버 투여시의 AUC보다 약 2배 더 높았다.
- 2) 수유부에 대한 투여: 이 약은 주된 대사체인 아시클로버에서 유출되는 이량으로 이형된다. 아시클로버는 혈장 농도의 0.6~4.1배의 농도로 유방 중에서도 검출되었으며, 아시클로버를 1회 200mg씩 1일 5회 투여했을 때, 정상상태에서 평균 최고혈장농도(Cssmax)는 3.1μM(0.7μg/mL)이다. 이에 의하면 수유중인 유아는 0.3mg/kg/일의 아시클로버에 노출될 수 있다. 유방에서의 아시클로버의 소실반감기는 2.6시간으로, 혈장에서의 소실반감기와 비슷하다. 신생아 단순포진감염증의 치료목적으로 아시클로버를 30mg/kg/일 정맥주사하지만, 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여해야 한다.
8. 소아에 대한 투여
- 이 약은 12세 이상 소아의 구순포진과 2세 이상 18세 미만 소아의 수두에 투여한다.
- 이 약의 구순포진 치료는 구순포진의 재발 병에 있는 성인과 청소년(12세 이상)을 대상으로 한 2가지의 이중맹검위약대조군 임상 시험을 근거로 한다.
- 이 약의 2세 이상 18세 미만 소아의 수두 치료는 발라시클로버를 투여하는 개방표지시험(open-label trial)으로부터 얻어진 단체 투여 약동학 및 반복 투여 안전성 자료를 근거로 하였다. 그리고 이는 소아 수두 환자에서 경구용 아시클로버 투여를 평가하는 3가지의 무작위 이중맹검, 위약대조시험의 유효성 및 안전성 자료에 의해 뒷받침되었다.
- 다음과 같은 소아 환자에서 발라시클로버의 유효성 및 안전성은 확립되지 않았다.
- 12세 미만, 구순포진
 - 18세 미만, 성기포진
 - 18세 미만, 대상포진
 - 2세 미만 수두
 - 신생아 HSV 감염 후 억제 요법
- 12세 미만 소아를 대상으로 하는 3가지의 개방표지 시험을 통해 발라시클로버의 경구용 현탁제에 대한 약동학적 프로파일 및 안전성이 연구되었고, 이 연구에서 유효성에 관한 평가는 실시되지 않았다.
- Study 1은 임상적으로 varicella-zoster virus(VZV) 감염이 의심되는 1세 이상-12세 미만 소아 27명을 대상으로 한 단체 투여 약동학 및 반복 투여 안전성 시험이다.
- Study 2는 혈장성 헤르페스 바이러스에 감염되었거나 감염의 위험이 있는 1개월 이상, 6세 미만의 소아를 대상으로 한 단체 투여 약동학 및 반복 투여 안전성 시험이다. 등록된 57명의 피험자에게 경구용 발라시클로버 현탁제 25mg/kg을 단체 투여하였다. 이 용량은 3개월 이상-6세 미만의 유아 및 아동에서, 성인의 발라시클로버 1g에 해당하는 아시클로버 전신 노출량(과거 자료)을 제공하였다. 1개월 이상-3개월 미만 유아 및 아동에서, 25mg/kg 용량에 기반하는 아시클로버의 평균 노출량은 성인에서 발라시클로버 1g 투여 후의 아시클로버 노출량보다 높았으나(Cmax: ↑30%, AUC: ↑80%). 아시클로버는 신생아 HSV 유아 및 아동에 대한 억제 요법으로 허가되지 않았고, 아시클로버의 자료를 통해 발라시클로버의 유효성을 의심할 수 없으므로 이러한 적용에는 발라시클로버가 권장되지 않는다.
- Study 3은 임상적으로 HSV 감염이 의심되는 1세 이상-12세 미만 소아 환자 28명을 대상으로 한 단체 투여 약동학 및 반복 투여 안전성 연구로, 이 연구에 등록된 소아는 성기포진에 감염되지 않았다. 피험자는 경구용 아시클로버 현탁제를 3-5일 동안 1회 10mg/kg씩, 1일 2회로 투여 받았다. 경구용 아시클로버 현탁제를 복용한 소아환자에서 아시클로버의 전신 노출량은 과거 재발성 성기포진 을 치료하기 위해 발라시클로버 또는 아시클로버의 경구 고용량제를 복용한 면역기능 정상인 성인의 아시클로버 전신 노출량과 비교되었다. 소아의 전체 연령대(1세이상-12세미만)에서 아시클로 버의 일일 전신 노출량은 발라시클로버를 1회 500mg씩, 1일 2회씩 투여받은 성인의 아시클로버 전신 노출량보다 낮았으나(Cmax: ↓20%, AUC: ↓33%), 아시클로버를 1회 200mg씩, 1일 5회 투여 받은 성인의 전신 노출량은 높았다(일일 AUC: ↑16%). 1세이상-12세미만 아동에서 재발성 성기포진에 대한 발라시클로버의 임상정보는 제한적이고 충분하지 않으므로 성인에 대한 유효성 자료를 아동에게 외삽하는 것은 불가능하다. 또한 발라시클로버는 1세 이상-12세 미만 소아의 재발성 성기포진에 대해 연구된 바가 없다.
9. 고령자에 대한 투여
- 이 약에 대한 임상 연구의 전체 피험자 수 중 906명은 65세 이상, 352명은 75세 이상이었다. 대상포진의 임상연구에서 대상포진 치료 후에 나타난 통증(post-herpetic neuralgia) 기간은 65세 미만 성인보다 65세 이상 환자에서 더 길었다. 노인 환자들은 신기능이 저하되어 있을 수 있으므로 용량을 감소하는 것이 요구된다.(노인환자에게서 신장 또는 중추신경계 관련 이상반응 발현률이 더 높을 것으로 보인다.)
10. 간기능 장애 환자
- 경증 내지 중증의 간경화 환자(간의 합성 기능이 정상인 환자)의 경우에는 별도의 투여량 조절이 필요치 않다. 중증의 간경화 환자(간의 합성기능부전 환자, 간문맥-전신성 문합의 징후를 보이는 환자)에 대해서는 혈액동맥학적 자료에 따르면 별도의 투여량조절이 필요치 않으나, 임상경험이 충분하지 않다. 그러므로 간기능 장애 환자에게 이 약을 고용량 투여시에는 신중히 투여해야 한다.
11. 복막투석환자
- 복막투석을 받는 환자에서 이 약 투여에 대한 정보는 없다. 아시클로버의 약동학에 미치는 만성 휴대복막투석(CAPD)의 연속 중정맥 혈액여과/투석(CAVHD)의 영향을 시험하였다. CAPD 및 CAVHD 후 아시클로버의 배설은 혈액투석을 받았을 때 적은 것으로 나타났고 약동학 변수는 혈액투석을 받지 않는 말기 신질환 환자에서 관찰되었던 것과 매우 비슷하였다. 따라서 이 약의 보조적인 투여는 CAPD 또는 CAVHD 이후에는 필요치 않다.
12. 과량투여시의 처리
- 1) 증상 및 징후: 급성 신부전 및 착각, 환각, 초조, 의식저하, 혼수 등을 포함한 신경계 증상 등이 이 약을 과량투여한 환자에서 보고되었다. 구역 및 구토도 또한 나타날 수 있다. 우발적인 과량투여를 방지하기 위해 주의해야 한다. 보고 사례의 대부분은 용량 감소가 적절하게 이루어지지 않아 이 약을 과량으로 반복투여하게 되었던 신기능 장애 및 고령 환자들이었다. 최대 20g의 아시클로버를 복용한 환자의 경우, 위장관 내에서 부분적으로 흡수되어, 독성이 나타나지 않았다. 아시클로버를 매일동안 과량 복용했을 때, 소화기계 이상반응(구역, 구토)과 신경계 이상반응(두통, 혼돈) 발생과 관련이 있었다. 과량의 아시클로버를 정맥주사했을 때 혈장 크레아티닌 상승과 뒤이은 신부전이 나타났으며, 혼돈, 환각, 초조, 발작, 혼수를 포함하는 신경계 이상반응이 정맥내 과량투여와 관련하여 나타났다.
 - 2) 처치: 이 약의 독성 징후에 대해 환자를 잘 관찰해야 한다. 혈액투석을 통해 혈중으로부터 아시클로버의 제거를 유익성 있게 증진시킬 수 있으므로 과량투여 증상이 나타난 경우 처치법으로 혈액투석을 고려할 수 있다.
13. 기타
- 1) 유전독성
In vitro 및 in vivo 유전독성 시험결과에 의하면, 이 약은 사람에게 유전적 이상을 초래하지는 않았다.
 - 2) 발암성
동물시험(마우스, 랫드) 결과 이 약은 발암성이 없었다.
 - 3) 수태성 및 임산성독성
랫드를 이용한 수태성 및 임산성시험에서 200mg/kg/일의 용량군에서 태자의 체중감소, 부하골, 출혈빈도의 증가, 설골의 골화 지연, 폐색성 신장병증(obstructive nephropathy)이 관찰되었고, 100mg/kg/일 및 200mg/kg/일 투여군의 암컷 신생자에게 이계 개전의 지연이 관찰되었다.
 - 4) 최기형성
랫드를 이용한 최기형성 시험에서 400mg/kg/일 투여군에서 신장에 약물결정의 축적, 초기흡수 및 착상 후 손실증가, 성조숙자수 감소, 골격변이의 발생증가(14번째 부하골 및 늑골출현, 흉골분절의 골화 지연, 27 천골전장척추의 증가)가 관찰되었다. 랫드에 대한 추가연구에서는 100mg/m의 혈장 중 농도와 모체에 독성을 나타내는 용량을 피하주사했을 때 태자 이상이 관찰되었다.
 - 5) 운전 및 기계조작 능력에 영향을 미치지 않았으므로 특별히 주의할 필요는 없다.
14. 보관 및 취급상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것

■저장방법: 기밀용기, 실온(1-30℃)보관

■포장단위: 알프레스 정 500일그리당: 10정, 42정

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.

TM=Trade mark

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질·변색 또는 오손된 제품은 약국·병의원 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

첨부서서 최종 개정 연월일: 2011. 07. 07

이 첨부서서 개정일자 이후 변경된 내용은 www.gskskorea.co.kr이나 아래 번호에서 확인할 수 있습니다.

제 조 원

제조의회사: GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd., 1061, Mountain Highway, Boronia Victoria, 3155, Australia

제 조 자: Glaxo Wellcome SA Avda Extremadura 3, 09400, Aranda de Duero, Burgos, Spain

수 입 원: 글락소 스미스클라인

서울시 용산구 한강로 2가 191

관 대 원:

본사: 서울시 동대문구 용두동 252번지

공장: 충청 천안시 차암동 404

문의전화: (02)920-8651