

일반의약품



분류번호:114 (해열·진통·소염제)

콜그린에이캡슐은 8가지 성분이 합리적으로 배합되어 콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(출고 열리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통 등 감기의 증상상(여러 증상)을 신속히 완화시킵니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

아세트아미노펜(KP)	100mg
에텐자미드(KP)	100mg
카페인무수물(KP)	12.5mg
클로르페니라민말레산염(KP)	1.25mg
덱스트로메토르판브로파수소산염수화물(KP)	8mg
루트셀타이민염(KP)	416mg
리보플라빈(KP)	2mg
dl-메틸에페드린염(KP)	8.75mg

첨가제(타르색소) : 적색3호, 황색4호, 황색5호, 황색203호

【성상】

황색의 가립상 가루가 든 상부 노란색 하부 등적색의 경질캡슐제

【약리작용】

1. 해열·진통작용

아세트아미노펜 및 에텐자미드는 해열·진통작용으로 두통, 인후(목구멍)통, 관절통, 근육통 등의 증상을 완화시키며, 카페인무수물은 해열, 진통 효과를 상승시켜줍니다.

2. 진해(기침을 그치게 함)작용

진해(기침을 그치게 함)제인 덱스트로메토르판브로파수소산염수화물은 해소증후에 직접 작용하고, dl-메틸에페드린염은 기관지를 확장시켜 기침을 억제합니다.

3. 항히스타민작용

클로르페니라민말레산염은 히스타민 수용체를 차단하여 히스타민의 작용을 억제함으로써 감기의 특징적인 증상인 재채기, 콧물, 코막힘 등의 증상을 완화시켜줍니다.

4. 비충혈(코막힘) 완화작용

dl-메틸에페드린염은 비강막의 충혈을 제거하여 콧물·코막힘의 증상을 개선시키며, 처방된 비타민 B₁₂(리보플라빈)은 위와 같은 성분들의 작용을 상승시켜줄 뿐만 아니라 피로회복 및 신경기능을 개선시켜 줍니다.

【효능·효과】

감기의 증상상(여러증상)(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(출고 열리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법·용량】

성인은 1회 2캡슐, 만 8-14세 어린이는 1회 1캡슐을 1일 3회 식후 30분에 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 현식을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
- 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

진해(기침을 그치게 함)제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염을 경구제, 알레르기약), 알레르기약

4. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 마십시오.

- 1) 이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있습니다. 다른 아세트아미노펜 제제와 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제제와 함께 복용해서는 안됩니다.
- 2) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사 약사와 상의 하십시오.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아 및 만 15세 미만의 어린이(구약이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 라이증후군 및 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의하십시오.)
- 2) 만 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 합니다. 만 2세 미만 영·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 합니다.

- 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 5) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장염, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 폐노(소변을 눌)곤란 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고령이 있는 사람
- 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장장애가 지속 혹은 재발되거나 췌장, 췌관염, 췌장염, 췌장암, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장장애가 지속 혹은 재발되거나 췌장, 췌관염, 췌장염, 췌장암
- 7) 구토와 심사로 많은 수분을 손실하거나 수분을 흡수하지 않는 사람 또는 이뇨제를 복용하는 사람
- 8) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 9) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 등종약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 10) 다음과 같은 기침이 있는 사람

흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열, 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

11) 이 약은 황색4호(타르트린), 황색5호(신셋펠로우 FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분과 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하고, 상담 시 가능한 한 이 정보를 제공하십시오.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(출혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 위통, 소화관출혈, 위부불쾌감, 난청(귀먹음), 부종(부기), 이명(귀울림), 배뇨곤란, 목마름(지속적이거나 심함), 어지러움, 불안, 떨림, 불면
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증후 증상이 나타난 경우
① 속(아나필락시스(과민성)) : 복통후 바로 두드러기, 부종, 가습단답함 등과 함께 인색이 장백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다.
② 피부점막만종후군(스티븐스-존슨증후군), 증후성표피괴사증후군(리델증후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있습니다.
- ③ 천식
- ④ 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)등이 나타날 수 있습니다.
- ⑤ 간질성폐렴 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타납니다.

3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 장기간 계속 복용하지 마십시오.
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.
- 4) 복용시에는 음주하지 마십시오.
- 5) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오.
- 6) 바로바로 복용할 약물, 삼합제 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다.
8. 저장상의 주의사항

【저장방법】

밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】

10캡슐

【제품문의처】

소비자 상담실 : 080-587-7575(수신자 요금부담)

【최신정보확인방법】

설명서 개정일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

- ※ 유통과정 중 사용기간이 경과되었거나 변질·변색 또는 오손된 제품은 약국계설자 및 의약품판매업자에 한하여 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다.

설명서 개정년월 : 2016. 11

http://www.myunginph.co.kr

ICL.G002001



※ 본 의약품을 사용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽고, 본 의약품과 함께 보관하십시오.