

에어로민

(Aeromin Caps.)

캡슐

기침 및 가래는 대기의 먼지, 매연 등의 심한 오염이나 흡연에 의한 담배연기 등의 유해물질들이 코점막을 통과하면서 기관 및 기관지로 이동하지 못하고 분비된 점액으로 둘러싸여 가래가 만들어 지고 이 가래를 배출하기 위하여 기침이 유발됩니다. 또한 감기나 독감 등의 호흡기질환 또는 알레르기 및 천식 등에 의해서도 기침이나 가래가 생성됩니다.

에어로민 캡슐은 가래를 묽게하여 거담(가래)작용이 있는 구아아콜설폰산칼륨, 기침중추에 직접 작용하는 덱스트로메토르판브롬화소산염수화물, 기관지 확장제 dl-메틸에페드린염산염 외 2종류의 성분이 합리적으로 배합되어 여러 원인으로 인한 기침, 가래의 증상을 신속하게 완화시킵니다.

【성분 · 함량】 (1캡슐 중)

노스카핀(KP)	10mg
dl-메틸에페드린염산염(KP)	12.5mg
카르비녹사민말레산염(USP)	2mg
구아아콜설폰산칼륨(KP)	45mg
덱스트로메토르판브롬화소산염수화물(KP)	10mg
첨가제(타르색소) : 적색 3호, 청색 1호	

【성분별 약리작용】

- **노스카핀**
중추신경계에 직접 작용하는 진해(기침을 그치게 함)제로서 강력하고 신속하게 기침을 억제합니다.
- **dl-메틸에페드린염산염**
기관지 확장제로 기관지근의 긴장을 완화시켜 진해(기침을 그치게 함)작용을 나타냅니다.
- **카르비녹사민말레산염**
항히스타민제로서 히스타민으로 인한 모세혈관 확장, 혈관 투과성 항진 및 평활근(특히 기관지 근육)수축을 억제하여 진해(기침을 그치게 함)작용을 나타냅니다.
- **구아아콜설폰산칼륨**
가래를 묽게하는 거담작용으로 진해(기침을 그치게 함)효과를 상승시킵니다.
- **덱스트로메토르판브롬화소산염수화물**
비마약성 진해(기침을 그치게 함)제로 기침에 대한 역치를 높이고 코데인과 동등한 진해(기침을 그치게 함)효과를 나타냅니다.

【성 상】 흰색의 분말이 충전된 상 · 하부 하늘색 불투명 캡슐제

【효능 · 효과】 기침, 가래

【용법 · 용량】 성인 1회 2캡슐, 1일 3회 식후 복용 하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
- 이 약은 유당수화물(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 환자
- 2) 약으로 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 3) 간장애, 신장애(신장장애), 갑상선질환, 당뇨병 등 병이 있는 환자, 고열 환자, 허약자
- 4) 심장병 및 고혈압 환자, 고령자(노인)
- 5) 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 또는 배뇨(소변을 뚫)장애 환자(항히스타민제를 함유하는 제제)
- 6) 수유부
- 7) 다른 약물을 투여받고 있는 환자

3. 부작용

- 1) 이 약을 투여하는 동안 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 식욕부진, 어지러움 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- 2) 이 약을 투여하는 동안 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의하십시오.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 수화(여러차례) 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

5. 상호작용

다음 약물과 병용(함께사용)투여하지 마십시오. : 다른 진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 감기약, 항히스타민제, 진정제, 알코올 등

6. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 3년

【포장단위】 자사포장단위 (외부용기 표기)

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 '소비자 분쟁 해결 기준'에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

코스닥상장
 **신일제약(주)**
충청북도 충주시 양성면 복상골길 28



설명서 개정년월일 : 2013.11.27