

기침, 가래, 천식에—

후루무실 캡슐 200mg

(아세틸시스테인)

일반의약품

분류번호

222
(진해거담제)

후루무실캡슐은 이타리 잠본사(Zambon Group)에서 개발한 아세틸시스테인을 원료로 하는 점액용해제로서 다양한 호흡기계 질환에 우수한 거담작용을 나타내므로 기침, 가래, 천식치료에 효과적입니다. 또한 최근 연구에서 비가역적이며 점진적으로 진행되는 만성폐쇄성폐질환(COPD) 치료에도 효과적이라는 사실이 밝혀졌습니다.

원료약품의 분량(1캡슐 중)

아세틸시스테인(USP) 200.0mg

캡슐기제(타르색소) : 적색40호, 황색4호, 청색1호

성상 이 약은 백색의 가루가 든 상부 암녹색, 하부 연녹색의 경질캡슐제입니다.

ID 200

후루무실캡슐은 이런 분에게 좋습니다.

1. 흡연자 및 간접 흡연자에게

흡연은 기도를 자극하며 가래와 기관지염증을 유발하는 요인이 됩니다. 후루무실캡슐은 담배 중의 유해한 화학물질을 산화시킬 뿐만 아니라 호흡기점막의 방어기전을 강화하여 담배로 인한 호흡기 이상증상을 개선시킵니다.

2. 공기오염에 노출된 도시인에게

각종 대기오염물질은 지속적으로 기관지에 염증을 일으켜 각종 세균이 침입하기 쉽게 만들어 만성호흡기장애를 일으키는 원인이 됩니다. 후루무실캡슐은 가래를 용해시키고 오염물질을 제거하는 작용을 함으로써 도시생활로 인한 호흡기질환 치료에 효과적입니다.

3. 환절기에 자주 감기에 걸리시는 분에게

환절기에는 갑작스런 기온변화로 코점막과 기관지점막이 건조해져 바이러스나 먼지 등에 대한 방어능력이 급속히 떨어지고 밀폐된 실내생활로 오염물질에도 자주 노출되 감기에 잘 걸리게 됩니다. 후루무실캡슐은 점막을 보호하며 병원균의 침입을 막아주므로 환절기에 자주 감기에 걸리시는 분에게 좋은 예방 및 치료효과를 나타냅니다.

4. 노인과 어린이에게

노인과 어린이는 호흡기를 자극하는 물질에 더 민감하게 반응하며 면역기능이 약해 쉽게 호흡기계 질환에 걸립니다. 후루무실캡슐은 노인들의 장기간 기침 및 가래, 어린이들의 잔기침 등에 좋은 효과를 나타냅니다.

5. 만성폐쇄성폐질환 환자에게

기도협착증상을 나타내며 비가역적이고 점진적으로 진행되는 만성폐쇄성폐질환(COPD)의 치료제에 기관지확장제나 부신피질호르몬제를 투여하는 것보다 후루무실캡슐 600mg을 1일 1회 용법으로 투여할 때 더 효과적으로 COPD의 증상악화속도를 낮출 수 있습니다.

효능 · 효과

- 1) 다음 질환에서의 객담(가래)배출곤란 : 급 · 만성 기관지염, 기관지확장증, 천식성기관지염, 기관지천식, 세기관지염, 낭성섬유증
- 2) 인 · 후두염, 부비강염, 삼출성 및 장액성 중이염

용법 · 용량

아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 복용합니다.

- 1) 급성질환 :
성인: 1회 200mg (1캡슐) 1일 3회, 소아(6~14세): 1회 200mg (1캡슐) 1일 2회
- 2) 만성질환 : 성인: 1회 200mg (1캡슐) 1일 2회, 소아(6~14세): 1회 100mg (1/2캡슐) 1일 3회

- 3) 남성성염증 : 소아(6세이상):1회 200mg(1캡슐) 1일 3회, 소아(2~5세):1회 100mg(1/2캡슐) 1일 4회
연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어 보신 후 복용하시기 바랍니다.

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 위·십이지장궤양 환자
- 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

신생아(중증질환이 아닌 경우 신생아에게 투여하지 마십시오.)

3. 부작용

- 1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염(입안염), 가슴쓰림, 설사 등이 나타날 수 있습니다.
- 2) 과민증 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명(귀울림), 기관지경련(특히 천식환자) 등이 나타날 수 있습니다.
- 3) 드물게 빈맥(빠른맥), 고혈압이 나타날 수 있습니다.
- 4) 국내 자발적 유해사례 보고자료(1989~2013 상반기)를 분석한 결과, 유해사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 유해사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유해사례는 다음과 같이 나타났습니다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 유해사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.

• 호흡곤란

4. 상호작용

경구용 항생물질(아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치암페니콜)과 병용투여(함께 복용)시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있습니다.(적어도 2시간의 간격을 두고 투여합니다.)

5. 임부에 대한 투여

임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우에만 투여합니다.

6. 수유부에 대한 투여

이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여하십시오.

7. 적응상의 주의

이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피해야 합니다.

※ 제품 개봉 또는 취급시에 포장재(알루미늄 호일지)로 인하여 상처를 입을 수 있으므로 주의 하시기 바랍니다.

※ 개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나, 직사광선이 닿는 곳에 보관하지 마십시오.

습기, 열, 빛은 약의 효과와 안정성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의 바랍니다.

저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 : 10, 30, 100, 300캡슐

○ 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

○ 이 설명서는 2015년 1월 20일자로 작성되었으며 이 후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

일동제약주식회사

본사 서울특별시 서초구 바우뚝로27길 2

공장 경기도 안성시 공단로 25

소비자상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)