

(멜파란) 전문의약품

주성분 : 멜파란(B.P.)2.00 mg

■ 효능·효과

- 2015.05.09

1. 다발성골수종
프레드니손과 병용하여 시 더 유효하며, 보통 멜파란으로서 1일 체중 kg당 0.15 mg과 프레드니손 40 mg을 분할하여 4일간 경구투여하며, 6주 간격으로 반복한다.
2. 난소선암
보통 이 약으로서 1일 체중 kg당 0.2 mg을 3회로 분할하여 5일간 경구투여하며, 골수 재생을 고려하여 4~8주 간격으로 반복한다.
3. 진행성유방암
이 약으로서 1일 체중 kg당 0.15 mg 또는 6 mg/m²을 4~6일간 경구투여하며, 3~6주 간격으로 반복한다. 골수독성이 관찰되면 감량한다.
4. 진행성혈구증가증

- 1) 이 약은 활성 세포독성제이므로 이러한 제제의 투여경험이 있는 의사의 지시하에서만 사용되어야 한다.
- 2) 이 약은 강력한 골수억제제이므로 과도한 골수억제의 가능성 및 비가역적인 골수무형성의 위험성을 피하기 위해 혈구수를 주의 깊게 모니터링해야 한다.
- 3) 이 약의 투여중지 후 지속적인 혈구수 감소가 있을 수 있으므로 백혈구 또는 혈소판수가 비정상적으로 크게 감소하는 최초 징후가 나타나는 경우 일시적으로 투여를 중지해야 한다

- 포장단위 : 25정/병

[계약제조원] : ASPEN Global Incorporated, 모리스셔스, c/o Kross Border Trust Services Limited, St Louis Business Centre Cnr Desroches & St Louis Streets Port Louis, Mauritius
[수탁제조원] : Excella GmbH, 독일, Nuernberger st. 12, D-90537 Feucht, Germany
[수입판매원] : 삼일제약, 한국, 서울시 서초구 방배동 990-1