

의약품 분류번호	237 정장제
-------------	------------

메디락-베베산은 다년간 장내 유익균 정장제를 만들어온 한미약품에서 축적된 기술과 Know-how를 가지고 유아들만을 위해 새롭게 만든 장내 유익균 정장제입니다. 특히 신생아와 유아들의 발육상태와 정상장내균총(正常腸內均菌叢)을 충분히 연구, 검토한 후 기존 제제들이 단점을 보완하며 소화불량(소화장애), 변비, 설사, 식욕부진, 영양장애, 장내이상발효(腸內異常發酵) 등 장내질환의 원인 치료 및 예방에 알맞도록 이상적으로 처방한 유아용 장내 유익균 정장제입니다. 또한 살아있는 장내 유익균이 1g당 2억5천만개라는 국내 유아용 정장제로는 그 함량이 가장 많은 고단의 처방 정장제입니다.

정상 장내균총(正常腸內均菌叢)이란 : 갓 태어나 유아의 장에는 균이 없는 무균상태입니다. 그러나 1~2 만 경과해도 유아의 장내에는 많은 균들이 서식하게 됩니다. 이때 유아의 장속에는 유아에게 도움이 되는 균들뿐만 아니라 해를 주는 균도 같이 서식하여 서로 견제와 균형을 이루게 되는데 이것을 정상 장내균총 (正常腸內均菌叢)이라고 합니다. 유아기에는 장내균총의 균형이 불안정하여 여러가지 배탈, 설사, 변지 등 장내질환을 일으키기 쉬우므로 알맞은 정장제를 복용시키는 것이 좋습니다.

【원료약품의 분량】 1g 중

바실루스서브틸리스균 · 엔테로코쿠스페숨균 배양물(별규) (생균수로서)	62.5mg
{ 엔테로코쿠스페숨	2.25×10 ⁸ 개
{ 바실루스서브틸리스	0.25×10 ⁸ 개
티아민염산염(KP)	0.3mg
리보플라빈(KP)	0.2mg
피리독신염산염(KP)	0.3mg

【성상】

황백색 가루

【효능·효과】

정장, 변비, 묽은 변, 복부팽만감, 장내이상발효

【용법·용량】

연령	1회 용량	용법
소아 : 3개월 이상~1세 미만	0.5g	1일 4회 물, 우유, 이유식 등에 타서 또는 그대로 복용한다.
1~2세	1g	
3세 이상	1.5g	

【사용상의 주의사항】

(산제)

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것. 1개월정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 다음 환자에는 투여하지 말 것. 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】

자사포장단위

【제품문의처】

한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

아기의 발육은 전체적인 몸의 균형으로 판정해야 하며 판정에 흔히 이용하는 것이 카우프지수입니다.

$$\text{카우프지수} = \frac{\text{체중(g)}}{\text{신장} \times \text{신장(Cm)}} \times 10 \text{으로 계산하는데,}$$

지수가 15~18이면 보통이고, 18~20은 대단히 영양상태가 좋은 우량아입니다. 20이상은 다소 뚱뚱한 편이지만 유아기에 들어서면 살이 빠지므로 걱정할 필요는 없으며, 비만아가 되는 것을 걱정해서 식사제한을 하지 않아도 됩니다.(단, 20이상은 병인 경우가 있으며, 13~15는 영양상태가 나빠서 살이 찌지 않는 경우가 있으니 약사나 의사와 상담하는 것이 좋습니다.)

• 카우프지수 계산예

아기의 신장 : 60cm, 아기의 체중 6,500g일 경우

$$\text{카우프지수} = \frac{6500}{60 \times 60} \times 10 = 18.05$$

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※ 주의

- 분말을 그대로 복용 시 소량씩 충분히 녹여 복용할 것.
- 아기의 체질에 따라 설사, 구토, 알리지 증상이 일시적으로 발생할 수 있음. 이 경우 증상이 사라질 때까지 기다리셨다가 소량을 다시 복용시켜 동일한 증상이 나타나지 않는 경우에는 적량까지 차차 증량해 나가면 됨. 소량을 복용시키셨을때 동일한 증상이 다시 나타나는 경우에는 복용을 중지할 것. (실리카겔(건조제)을 먹지 말 것.)
- 이 제품은 영양성분이 다량 함유된 생균제제로 개봉 후 사용상의 부주의로 인한 벌레 등 이물질의 혼입 가능성이 있으므로 아래 사항을 준수해 줄 것.
 - 사용하신 후에는 즉시 마개를 꼭 닫아 냉장보관해 줄 것.
 - 사용하신 스푼은 물로 씻고 물기를 제거한 후 스푼케이스에 넣어 위생상태로 보관해 줄 것.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.
*본 제품내에 갈색 또는 회갈색의 입자가 있는 경우가 있으나,
이는 장내 유익균체로 제품의 품질에는 이상이 없으니 안심하고 드십시오 *

설명서 개정연월일 : 2015. 12. 17

Hanmi 한미약품(주)

(본사)서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장)경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.