

셀프라이드 정

(레보셀피리드 25mg)

전문의약품

의 약 품	239
분류번호	기타의 소화기관용약

【원료약품의 분량】 1정 중

레보셀피리드 (KPC)25.0mg

【성 상】

백색의 원형정제

【효능 · 효과】

기능성 소화불량으로 인한 다음 증상의 완화 : 복부팽만감, 상복부 불쾌감, 속쓰림, 트림, 구역, 구토

【용법 · 용량】

성인 : 레보셀피리드로서 1회 25mg을 1일 3회 식전에 경구투여한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 위장관운동자극이 유해한 환자(예, 위장관 출혈, 기계적인 장애 또는 천공이 있는 환자)
- 크롬틴화세포중 환자(중양으로 인해 카테콜아민 방출에 기인한 고혈압을 유발할 수 있다.)
- 이 약에 과민반응이 있거나 불내성인 환자
- 간질환자, 조병 상태 및 조울병의 조병단계의 환자
- 악성유산병증 환자(대부분의 항정신성 의약품이 가지고 있는 프로락틴 과분비 효과와 유방 형성 장애간에 상호관련성이 있다고 여겨진다.)
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유당분해 효소결핍증(Lapp lactase deficiency)또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 고혈압 환자
- 약제(추체외로 증상이 발현되기 쉬우므로 과량 투여하지 않도록 주의할 것.)
- 고령자

3. 이상반응

- 내분비계 : 때때로 간뇌의 내분비기능조절이상(성선자극호르몬 분비 및 프로락틴분비 이상)에 기인한다고 추정되는 무월경, 유즙분비과다, 여성형유방증이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰 하고 이상이 나타나면 즉시 투약을 중지한다.
- 추체외로계 : 드물게 진전, 허의 꼬임, 초조감 등이 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 투약을 중지한다.
- 지연이상운동(tardive dyskinesia) : 장기투여에 의해서 드물게 입주위 등에 불수의 운동이 나타 나서 약물투여를 중지한 후에도 지속되는 수가 있다.
- 소화기계 : 때때로 구갈, 속쓰림, 구역, 구토, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
- 순환기계 : 고혈압, 부정맥
- 신경이완제악성증후군(Neuroleptic Malignant Syndrome) : 이 약을 항정신병 치료과정에서 신경이완제로 투여하는 중에 신경이완제 악성증후군이 보고된 바 있다. 이와 관련된 증상으로는 고열, 근육강직, 운동불능, 자율신경계 장애(불규칙한 맥박과 혈압, 발한, 빈맥, 부정맥), 무감각 또는 혼수상태로 발전가능한 의식상태의 변화 등이 있는데 이러한 증상이 나타날 경우, 가급적

이 약을 비롯한 항정신병 약물의 투여를 즉시 중단하고 체냉각과 수분공급 등 집중적인 대증요법을 실시한다. 이러한 증상의 발현시에는 백혈구 증가, 혈청 크레아티닌아제(CK) 상승이 자주 나타나고 미오글로빈뇨증을 수반 한 신기능저하가 나타날 수 있다. 신경이완제악성증후군 환자가 고열이 지속되고 의식장애, 호흡곤란, 순환하탈과 탈수증상, 급성 신부전으로 발전 되어 사망했다는 보고도 있다.

- 기타 : 드물게 발진, 부종이 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 약물 투여를 중지한다. 또한 때때로 화끈감, 권태감, 불면, 졸음, 어지럼, 비틀 거림이 나타날 수 있고 드물게 발기부전이 나타날 수 있다.
- 장기투여의 경우 무월경, 여성형유방증, 유즙분비과다, 상복의 증감 등의 이상반응이 나타날 수 있는데 이는 다른 신경이완제들과 유사하게 시상 하부 뇌하수체 생식선 제2경추의 기능에 대한 효과로서 가역적이다.

4. 일반적 주의

- 간뇌의 내분비기능조절이상으로 인해 프로락틴의 분비가 증가하고 유즙 누출의 이상반응이 있으므로 처방 전 반드시 환자에게 주지시킨다.
- 간뇌의 내분비기능조절이상, 추체외로 증상 등의 이상반응을 일으킬 수 있으므로 유효성과 안전성을 충분히 고려하여 투여한다.
- 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 및 주의를 집중해야 하는 기계조작 을 피하는 것이 바람직하다.
- 고용량의 레보셀피리드 제제는 일부 해외 국가에서 비정형 항정신병 치료 제(atypical neuroleptics)로서 처방되고 있다. 동일한 계열의 비정형 항정신병약에서 드물게 QT연장, 심실부정맥(예, Torsades de Pointes), 심실성 빈맥, 심실세동, 심장 정지가 관찰된 바 있으며 이러한 심장의 이상은 매우 드물게 사망을 초래할 수 있으므로 주의가 필요하다. 또한 비정형 항정신병약을 복용하고 있는 고령의 치매환자를 대상으로 한 임상 시험의 결과, 항정신병약의 복용은 위약 대비 뇌혈관 사건을 약 3배 증가 시키는 것으로 관찰되었다. 이러한 이상반응의 매커니즘은 아직 알려져 있지 않고 다른 항정신병약, 다른 환자군에서의 위험 증가를 배제할 수 없으므로 뇌졸중 위험요소를 지닌 환자에게 이 약을 투여할 경우에는 반드시 하가상의 용법, 용량에 따라 신중히 투여해야 한다.

5. 상호작용

- 위장관운동에 대한 이 약의 효과는 항콜린효능약(아트로핀, 메틸스코폴라 민 등), 마약 및 진통제에 의해 길항적으로 나타날 수 있으므로 병용투여 하지 않는다.
- 디기탈리스제제 포하시의 지표인 구역, 구토, 식욕부진 증상을 불현성화 할 수 있으므로 디기탈리스제제를 투여받고 있는 환자에서는 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다.
- 다른 벤즈아미드계 약물(메토클로프라마이드, 티아프리드 등)과의 병용에 의한 내분비기능이상 또는 추체외로 증상이 발현되기 쉬우므로 이것들을 병용하는 경우에는 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다.
- 정신약리학적 약물과의 병용투여 시 상호작용에 기인한 예기치 않은 이상 반응이 나타날 수 있으므로 특별히 주의하여야 하며 알코올과 동시투여 하지 않는다.
- 이 약을 QT 간격을 연장시키는 약물과 병용투여 시 심장부정맥의 위험성 이 증가되므로 병용하는 경우에는 충분한 주의와 관찰이 필요하다.
- 전해질 장애를 일으키는 약물과 병용투여하지 않는다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

동물실험에서 태자에 대한 기형발생의 위험이 있는 것으로 보고되어 있으며, 임신중 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 투여하지 않는다. 신생아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 수유중인 여성에게는 투여 하지 않는다.

7. 고령자에 대한 투여

주로 신장으로 배설되는 고령자는 신기능이 저하되어 있는 경우가 많아 높은



혈장농도가 지속될 우려가 있으므로 이상반응(추체외로 증상 등)의 발현에 주 의하고 용량 및 투여간격에 유의하는 등 신중히 투여한다.

8. 기타

- 진토작용으로 다른 약에 기인하는 중독, 장폐색, 뇌종양에 의한 구토증상 이 나타나지 않게 할 수 있으므로 충분히 관찰하고 신중히 투여한다.
- 동물 만성독성 실험에서 정소위축과 번식실험에서 임신율의 저하를 일으 킨다는 보고가 있다.
- 캣트 및 마우스에 고용량을 장기간 투여한 결과 하수체, 유선 등의 종양 발생빈도가 대조군에 비해 높다는 보고가 있다.

【저장방법 및 사용기간】

기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

【포장단위】

자사포장단위

【제품문의처】

한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습 니다.
(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※ 주의

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.
- 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.
- 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.
- 개봉 후 충전물이 있을 경우, 완전히 제거하고 사용하시기 바라며, 개봉 후 두정을 잘 닫아 보관하십시오.
(실리카겔(건조제)을 먹지 마십시오.)

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 개정연월일 : 2013. 01. 20

Hanmi 한미약품(주)

(본사)서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장)경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자에게서는 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지 (www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.