

뇌기능 개선제
카니틸[®]정
(아세틸-L-카르니틴염산염)

전문의약품

의약품 분류번호	219 기타의 순환계용약
-------------	------------------

의료기술 및 생활조건의 향상으로 해마다 노인인구층이 늘어감에 따라 노인성 질환 또한 증가하고 있습니다. 그중에 특히 '치매'라고 불리는 지적장애 증상은 기억장애 및 판단력 장애 등 여러가지 병적 증상을 수반하게 됩니다. 아세틸엘 카르니틴은 인체내 여러기관, 특히 뇌에 존재하는 생리적 물질로서 퇴행성 질환이나 중풍 등의 뇌혈관 질환과 같이 중추신경계의 손상으로 인한 치매증상에 효과가 뛰어납니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

아세틸-L-카르니틴염산염 (KPC) 590mg
(아세틸-L-카르니틴으로서 500mg)

【성상】

백색의 장방형 제피정

【효능·효과】

일차적 퇴행성질환 또는 뇌혈관질환에 의한 이차적 퇴행성질환

【용법·용량】

1회 1정, 1일 2~3회 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 금기
이 약에 대해 과민반응을 나타내는 환자에는 투여하지 마십시오.
2. 부작용
이 약의 복용시 드물게 흥분작용이 나타나는 수가 있으나 체내의 약용량이 감소함에 따라 이런 증상은 바로 소실됩니다.
3. 임부와의 투여
동물실험에서의 태아독성은 보고된 적이 없지만 임신초기 3개월 기간과 수유기의 여성은 꼭 필요한 경우에만 의사의 감독 하에서 복용하십시오.
4. 다른 약물과의 상호작용은 없는 것으로 알려져 있습니다.

【저장방법 및 사용기간】

밀폐용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 24개월

【포장단위】

자사포장단위

【제품문의처】

한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

※ 주의

1. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2. 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.
3. 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.
4. 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.
5. 포장을 개봉하여 복용 시 가끔 정제에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 정제에 포장물이 있는지 꼭 확인하고 복용하십시오.
6. 본 제품은 장용코팅되어 있으므로, 갈아서 조제하지 마십시오.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

※ 본 제품은 흡습성이 우려되므로 Alu-Alu 상태로 조제 또는 보관하여 주십시오 ※

설명서 개정연월일 : 2012. 07. 06

Hanmi 한미약품(주)

(본사) 서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장) 경기도 화성시 팔탄면 무화로 214

**※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.**

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.

(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.