

인쇄사양서				 건일바이오팜(주)
제 품 명	건피드정	개 정 번 호	개 정 이 력	
자 재 구 분	설명서	280101	신규	
규격(mm)	95 X 250	207627-01	고유번호 변경 280101 → 207627	
서 체 정 보	전문의약품 7.5pt, 원료약품 및 그분량, 본문 7pt,			
	PL문구 6pt			
인 쇄 칼 라	 PANTONE Cool Gray 11 C			
재 질	모조지 70g			
접 지	3단접지			
최종개정번호	207627-01			
최종수정일	2025.05.30			
제 작 업 체	우성원색			



건피드정

레보설퍼리드

전문의약품

Kuhnpid Tab.

원료약품 및 그 분량 1정 중

- 유효성분: 레보설퍼리드(KP) 25mg
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(건강한 소의 우유)
- 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨

성상
흰색의 원형정제

효능 · 효과
기능성소화불량으로 인한 다음 증상의 완화: 복부팽만감, 상복부불쾌감, 속쓰림, 트림, 구역, 구토

용법 · 용량
성인 : 레보설퍼리드로서 1회 25 mg을 1일 3회 식전에 경구투여한다.

사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 2) 위장관 운동 자극이 유해한 환자(예, 위장관 출혈, 기계적인 장애 또는 천공이 있는 환자)
 - 3) 크롬친화세포종 환자(종양으로 인해 카테콜아민 방출에 기인한 고혈압을 유발할 수 있다.)
 - 4) 이 약에 과민반응이 있거나 불내성인 환자
 - 5) 뇌전증 환자, 조병 상태 및 조울병의 조병 단계의 환자
 - 6) 악성 유선병증 환자(대부분의 항정신성 의약품이 가지고 있는 프로락틴 과분비 효과와 유방 형성 장애 간에 상호 관련성이 있다고 여겨진다.)
 - 7) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 고혈압 환자
 - 2) 소화(추체외로 증상이 발현되기 쉬우므로 과량투여하지 않도록 주의할 것.)
 - 3) 고령자
- 이상반응
 - 1) 내분비계 : 때때로 간뇌의 내분비 기능 조절 이상(성선 자극 호르몬 분비 및 프로락틴 분비 이상)에 기인한다고 추정되는 무월경, 유즙 분비 과다, 여성형 유방증이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 나타나면 즉시 투약을 중지한다.
 - 2) 추체외로계 : 드물게 진전, 허의 꼬임, 초조감 등이 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 투약을 중지한다.
 - 3) 지연 이상 운동(tardive dyskinesia) : 장기투여에 의해서 드물게 입 주위 등에 불수의 운동이 나타나서 약물투여를 중지한 후에도 지속되는 수가 있다.
 - 4) 소화기계 : 때때로 구갈, 속쓰림, 구역, 구토, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
 - 5) 순환기계 : 고혈압, 부정맥
 - 6) 신경이완제 악성 증후군(Neuroleptic Malignant Syndrome) : 이 약을 항정신병 치료 과정에서 신경이완제로 투여하는 중에 신경이완제 악성 증후군이 보고된 바 있다. 이와 관련된 증상으로는 고열, 근육강직, 운동불능, 자율신경계 장애(불규칙한 맥박과 혈압, 발한, 빈맥, 부정맥), 무감각 또는 혼수상태로 발전 가능한 의식 상태의 변화 등이 있는데 이러한 증상이 나타날 경우, 가급적 이 약을 비롯한 항정신병 약물의 투여를 즉시 중단하고 체온각과 수분공급 등 집중적인 대증요법을 실시한다. 이러한 증상의 발현 시에는 백혈구 증가, 혈청 크레아틴키나아제(CK) 상승이 자주 나타나고 미오글로빈뇨증을 수반한 신기능 저하가 나타날 수 있다. 신경이완제 악성 증후군 환자가 고열이 지속되고 의식장애, 호흡곤란, 순환 허탈과 탈수 증상, 급성 신부전으로 발전되어 사망했다는 보고도 있다.
 - 7) 기타 : 드물게 발진, 부종이 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 약물투여를 중지한다. 또한 때때로 화끈감, 권태감, 불면, 졸음, 어지럼, 비틀거림이 나타날 수 있고 드물게 발기부전이 나타날 수 있다.
 - 8) 장기투여의 경우 무월경, 여성형 유방증, 유즙 분비 과다, 성욕의 증감 등의 이상반응이 나타날 수 있는데 이는 다른 신경이완제들과 유사하게 시상하부 뇌하수체 생식선 제2경추의 기능에 대한 효과로서 가역적이다.
- 일반적 주의
 - 1) 간뇌의 내분비 기능 조절 이상으로 인해 프로락틴의 분비가 증가하고 유즙 누출의 이상반응이 있으므로 처방 전 반드시 환자에게 주지시킨다.

- 2) 간뇌의 내분비 기능 조절 이상, 추체외로 증상 등의 이상반응을 일으킬 수 있으므로 유효성과 안전성을 충분히 고려하여 투여한다.
- 3) 이 약을 투여 중인 환자는 자동차 운전 및 주의를 집중해야 하는 기계 조작을 피하는 것이 바람직하다.
- 4) 고용량의 레보설피리드 제제는 일부 해외 국가에서 비정형 항정신병 치료제(atypical neuroleptics)로서 처방되고 있다. 동일한 계열의 비정형 항정신병약에서 드물게 QT 연장, 심실 부정맥(예, Torsades de Pointes), 심실성 빈맥, 심실세동, 심장 정지가 관찰된 바 있으며 이러한 심장의 이상은 매우 드물게 사망을 초래할 수 있으므로 주의가 필요하다. 또한 비정형 항정신병약을 복용하고 있는 고령의 치매 환자를 대상으로 한 임상시험의 결과, 항정신병약의 복용은 위약 대비 뇌혈관 사건을 약 3배 증가시키는 것으로 관찰되었다. 이러한 이상반응의 매커니즘은 아직 알려져 있지 않고 다른 항정신병약, 다른 환자군에서의 위험 증가를 배제할 수 없으므로 뇌졸중 위험 요소를 지닌 환자에게 이 약을 투여할 경우에는 반드시 허가상의 용법, 용량에 따라 신중히 투여해야 한다.

5. 상호작용

- 1) 위장관 운동에 대한 이 약의 효과는 항콜린 효능약(아트로핀, 메틸스코폴라민 등), 마약 및 진통제에 의해 길항적으로 나타날 수 있으므로 병용투여 하지 않는다.
- 2) 디기탈리스 제제 포화 시의 지표인 구역, 구토, 식욕부진 증상을 불현성화 할 수 있으므로 디기탈리스 제제를 투여받고 있는 환자에서는 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다.
- 3) 다른 벤즈아미드계 약물(메토클로프라마이드, 티아프리드 등)과의 병용에 의한 내분비 기능 이상 또는 추체외로 증상이 발현되기 쉬우므로 이것들을 병용하는 경우에는 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다.
- 4) 정신약리학적 약물과의 병용투여 시 상호작용에 기인한 예기치 않은 이상반응이 나타날 수 있으므로 특별히 주의하여야 하며 알코올과 동시투여하지 않는다.
- 5) 이 약을 QT 간격을 연장시키는 약물과 병용투여 시 심장 부정맥의 위험성이 증가되므로 병용하는 경우에는 충분한 주의와 관찰이 필요하다.
- 6) 전해질 장애를 일으키는 약물과 병용투여하지 않는다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

동물실험에서 태자에 대한 기형 발생의 위험이 있는 것으로 보고되어 있으며, 임신 중 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 투여하지 않는다.

신생아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 수유 중인 여성에게는 투여하지 않는다.

7. 고령자에 대한 투여

주로 신장으로 배설되나 고령자는 신기능이 저하되어 있는 경우가 많아 높은 혈장 농도가 지속될 우려가 있으므로 이상반응(추체외로 증상 등)의 발현에 주의하고 용량 및 투여간격에 유의하는 등 신중히 투여한다.

8. 기타

- 1) 진동작용으로 다른 약에 기인하는 중독, 장폐색, 뇌종양에 의한 구토 증상이 나타나지 않게 할 수 있으므로 충분히 관찰하고 신중히 투여한다.
- 2) 동물 만성 독성 실험에서 정소 위축과 번식실험에서 임신율의 저하를 일으킨다는 보고가 있다.
- 3) 랫트 및 마우스에 고용량을 장기간 투여한 결과 하수체, 유선 등의 종양 발생빈도가 대조군에 비해 높다는 보고가 있다.

저장방법 기밀용기 실온(1~30℃)보관

포장단위 30정/병, 500정/병

제조사 (주)메디카코리아 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 96

제조의뢰자 건일바이오팜주식회사 충청남도 천안시 서북구 직산읍 거리막길 33 제일동

- 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)
- 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하시기 바랍니다.
- 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 반드시 의사·약사와 상담 후 사용하십시오.
- 본 제품의 모든 문헌사항(품질관련)은 (02)714-0091로 연락하시기 바랍니다.

- 만약 구입시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자에게만 교환하여 드립니다.
- 본사는 제조물 책임법 시행에 따라 고객상담 전용창구(전화 080-719-2000)를 운영하고 있습니다.

- 최신의 정보 확인방법** : 이 첨부문서 최종개정년월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.kuhnlabiopharm.com)에서 확인할 수 있습니다.
- 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.

최종개정년월일 2025.04.02
207627-01(뒤)