



● Analgesic & Anti-inflammatory ●

RHEUMACAN Plaster

Ketoprofen 30 mg

- 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) ⇨ '정보마당' ⇨ '의약품등 정보'를 참조하세요.
- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질, 변태 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

DK010612



■ 원료약품 및 그 분량 : 1매(10×7cm, 1.0g) 중

케토프로펜(KP) 30mg

■ 성 상 : 무색투명한 점착성 물질을 린트포에 도포하여(바르다) 고체면에 바리지를 덮은 침투제

■ 효능·효과 : 다음 질환 및 증상의 진통·소염(항염)

① 퇴행성관절염(골(뼈)관절염) ② 어깨관절주위염 ③ 건염(힘줄염)·건초염(힘줄윤활막염) ④ 건(힘줄)주위염

⑤ 상완골(위팔뼈)상과골(테니스 엘보우 등) ⑥ 근육통 ⑦ 외상성치후의 통증(부기)·동통(통증)

■ 용법·용량 : 약면의 바리지를 떼어낸 후 환부(질환 부위)에 1일 2회 부착한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 ① 이 약 및 이 약 성분에 과민증 및 광과민증의 병력이 있는 환자 ② 아스피린 천식(비스테로이드성 소염(항염)진통제 등에 의한 천식발작의 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(천식발작을 일으킬 수 있다.) ③ 다음의 약물에 과민증의 병력이 있는 환자 : 티아프로렌산, 페노피비레이트, 베자피비레이트, 시프로피비레이트, 옥시벤존(케토프로펜과 교차과민반응을 유발할 수 있다.) ④ 임신기간 6개월 이상인 임부 : 임신말기의 컷트에 이 약을 경구투여(먹는다. 복용한다)한 실험에서 태자의 동맥혈관수축이 보고되었다. 임신후기에 투여(경구, 주사, 직장(곧창자)주입시 지속성 태아수축, 태아 신부전지 나타났다는 보고가 있다. ⑤ 15세 미만의 소아

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것 ① 기관지 천식 환자(천식발작을 일으킬 수 있다.) ② 의사의 치료를 받고 있는 환자 ③ 임부 또는 수유부(안전성이 확인되어 있지 않으므로 대량 또는 광범위에 걸친 장기간의 사용은 피한다.) 3. 다음과 같은 경우는 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것 삼삼기 가능한 한 이 침투문서를 소지할 것 ① 드물게 속, 아나필락시양 증상(두드러기, 호흡곤란, 얼굴부기 등 과민성유사증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지한다.) ② 천식발작을 유발할 수 있으므로 건설 수표음(거품소리), 천형(숨을 쉴때 거품), 호흡곤란 등의 초기증상이 나타날 경우에는 사용을 중지한다. 천식발작은 이 약 적용 후 수시간 내에 나타난다. ③ 피부 : 때때로

발적(충혈되어 붉어짐), 발진, 가려움, 수포, 짓무름, 자극감 및 통증(부기) 등의 접촉피부염, 피부건조 및 색소 침착이 나타날 수 있다. 또한 직사광선(자외선)에 의해 광과민증이 나타날 수 있으며 피부발진이 전신으로 확대될 수 있다. 이러한 증상이 심한 경우에는 사용을 중지한다. ④ 1주일 정도 사용하고도 증상개선이 보이지 않을 경우 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다. 4. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항 ① 이 약을 사용 중이거나 사용 후 2주까지는 날씨에 관계없이, 욕지활동을 피하고, 일상 외출할 때에는 이 약의 도포(바르다)부위를 옷, 선글라스, 모자, 자외선 차단제 등으로 가려 자외선에 노출되지 않도록 한다. 흰색이나 밝은 옷은 자외선을 투과시킬 수 있으므로 유색 옷을 입는다.(자외선에 의해, 사용 중 또는 사용 후 광과민증이 나타났다는 보고가 있다.) ② 이 약에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)이다. ③ 피부감염증을 드러나지 않게 할 수 있으므로 감염에 수반되는 염증에 사용하는 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균(항곰팡이)제를 병용(함께 사용)하고 충분히 관찰하여 부작용 발현(드러냄, 드러남)에 유의한다. ④ 만성질환(퇴행성관절염(골(뼈)관절염)등)에 사용하는 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려한다. 또한 상태를 충분히 관찰하여 이상반응에 유의한다. ⑤ 눈 및 점막에는 사용하지 않는다. ⑥ 아손상된 피부 및 점막, 습진 또는 발진 부위에 사용하는 경우 일시적인 자극 및 날카로운 통증을 일으킬 수 있으므로 사용시 주의한다. ⑦ 무중, 백선 등에는 사용하지 않는다. ⑧ 밀봉봉대법을 사용하지 않는다. 5. 저장상의 주의사항 ① 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. ■ 저장방법 : 차광기밀용지, 실온보관(1~30℃) ■ 포장단위 : 7매

- 이 침투문서 작성일자 2012년 6월 1일 이후 변경된 내용은 홈페이지 : www.dkpc.co.kr 나 ☎ 080-776-1472 에서 확인할 수 있음.

제조의회사



주요주식회사

경기도 평택시 산단로 115

● 소비자상담실 : 080-776-1472

제조사



주요주식회사

한남공장 : 경기도 화성시 한남읍 제약공단3길 83

한성공장 : 강원도 화성군 한성읍 한성로 495

· 제조번호 :

· 사용기한 :